

Bambuterol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Bambuterol	Lungtec®	肺喘克錠	10 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 治療支氣管氣喘：可使支氣管放鬆，呼吸道暢通。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對 bambuterol 或 terbutaline 其本品所含所有其他成份過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥應盡量避免攝取含麻黃鹼(如市面上的一些減肥藥)或育亨賓(yohimbine)成分的中藥或食品，否則會增加藥物的副作用如精神亢進、失眠、心悸等。
 2. 服用本藥可能會增加血糖值，糖尿病患者應小心監測血糖。
 3. 長期服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
 4. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳，患有心臟血管疾病、心律不整、肝、腎功能不全、甲狀腺機能亢進或糖尿病等其他病史，請告知醫師。
 5. 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請諮詢醫師或藥師。特別是若有正在服用心臟血管用藥、單胺氧化酶抑制劑(MAO inhibitors：如 moclobemide)或三環抗憂鬱藥(如：imipramine)等處方或非處方的用藥，請告知醫師。
 6. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏、呼吸困難、心悸、心跳加快、強直性肌肉痙攣、臉潮紅。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
震顫、頭痛、坐立不安、神經質。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/6/10 修訂】

BTC00EQ03-02