

Baclofen 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Baclofen	Bafen®	痛獲平錠	10 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 用於脊髓和大腦之疾病或損傷所引起之肌肉痙攣。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 - 1 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 - 1 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 - 1 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
 - 2 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 - 1 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料併服，否則會增加藥品的中樞抑制作用(如頭暈、嗜睡)。
 - 2 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
 - 3 糖尿病病患服用本藥可能會導致血糖的上升，因此服藥期間應小心監測血糖。
 - 4 長期服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
 - 5 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳，肝、腎功能不全、卵巢囊腫，姿勢或平衡問題，呼吸不全、精神疾病、癲癇、消化性潰瘍、糖尿病、最近的中風、自主神經反射不良等其他疾病病史，請告知您的醫師。
 - 6 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請諮詢醫師或藥師。
 - 7 長期連續服用此藥時，突然中止服藥會引起幻覺、錯亂或痙攣發作，因此沒有醫師指示不可自行停藥或調整劑量。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 - 1 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏。頭暈，昏厥。癲癇發作。肌肉無力，呼吸困難，視覺異常。增加小便的次數或頻率。
 - 2 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
混亂，頭痛，睡眠困難。便秘，噁心。嗜睡，頭暈或虛弱。