

Travoprost eye drops 衛教單張

商品名	中文名
IZBA [®] eye drops	愛爾康易舒壓點眼液

◆ 組成：

1. Travoprost eye drops, 0.03mg/mL, 2.5ml/bot

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 適用於降低高眼壓或隅角開放性青光眼成年患者之眼壓。

◆ 使用方式：

1. 一天一次，於晚上點於患眼一滴，使用頻次不建議超過一天一次。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對此成分過敏之病患。

◆ 忘記用藥時該如何處理？

1. 盡可能在您想起時立刻補用一個劑量，但若幾乎到了使用下一個劑量的時間，那就略去錯過的劑量並恢復到定期的用藥時間表。千萬別為了補上錯過的劑量而使用雙倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 請保存於 30°C 以下。

◆ 注意事項：

1. 使用時請注意手指及眼睛盡量不碰觸到藥瓶瓶口。
2. 有配戴隱型眼鏡者，須取下再點藥。
3. 與其他眼用藥水需間隔至少五分鐘以上，眼用藥膏至少間隔十分鐘以上。
4. 本無水晶體或人工水晶體囊撕裂的患者應小心，可能發生黃斑部水腫。
5. 此藥易有眼部色素沉著(如：虹膜顏色加深)，可能為永久性。
6. 眼部若原有發炎現象可能會加劇。
7. 患有其他眼部狀況(如外傷或感染)、接受眼部手術，或發生任何眼部反應(尤其是結膜炎和眼瞼反應)，應立即詢問其醫師是否應繼續使用。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
發生全身性過敏、眼部感染加劇或黃斑部水腫徵兆(如 視力逐漸模糊)。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
眼睛充血、視力減退、眼睛不適、異物感、疼痛及發癢。