

## Carboxymethylcellulose sodium/Glycerin 眼用劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Carboxymethylcellulose sodium/Glycerin	Optive Fusion®	優麗舒	0.4 毫升/支

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 暫時緩解因眼睛乾澀所引起灼熱感與刺激感。
2. 暫時緩解因配戴隱形眼鏡造成之不適。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥或其賦形劑過敏者。

◆ **使用方式：**

1. 使用前請先將手洗淨擦乾。
2. 打開一次性容器瓶蓋，頭部往後仰或平躺。
3. 一手手指置於眼睛正下方之臉頰處，輕輕下拉下眼瞼，使眼球及眼瞼分開形成一個眼窩。用另一隻手將滴管靠近您的眼睛。輕輕擠壓容器，使 1 滴進入下眼瞼和眼球之間的眼窩穹窿內。一次投予一滴或依醫師指示的藥量投予，注意容器瓶嘴不要接觸到睫毛或眼睛，以防受到污染。
4. 閉上眼睛，同時用手指頭壓住兩鼻側淚管開口 3~5 分鐘。
5. 若有流至眼睛周圍之眼藥水或淚水可用紙巾擦拭乾淨，使用後再洗手。
6. 若需點兩種以上眼藥水時，請相隔 5 分鐘以上再重複上述步驟點第二種眼藥水。眼用藥膏至少間隔十分鐘以上再點。

◆ **藥品儲存：**

1. 可回蓋式不含防腐劑拋棄式小包裝眼藥水，開封後須 24 小時內使用完畢，未使用完之溶液請勿繼續使用。
2. 請儲存於 25°C 以下，未使用之單支裝點眼液應存放原包裝內。
3. 為防止兒童誤食，請放在兒童無法取得的地方。

◆ **注意事項：**

1. 使用本藥後可能出現短暫視力模糊的現象，而影響駕車或操作機械的能力，應等視力恢復清晰後再行駕車或操作機械。
2. 超過保存期限的眼藥水，或藥液混濁、變色或出現異物時請丟棄。
3. 為避免藥品交互污染或傷及眼睛，使用時請勿碰觸藥瓶瓶口或直接碰觸到患眼，並避免與他人共用，或以其他容器承裝。
4. 使用 3 天後若症狀未改善，請停藥並回診。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
嚴重過敏。眼睛劇痛、持續視力模糊或眼睛持續發紅、腫、熱、刺激感。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
眼睛刺激感、眼睛充血、眼睛痛、眼睛癢。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2020/07/27 修訂】

BTC00EV12-02