

Clobetasol Propionate 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Clobetasol Propionate	Vimax [®] Foaming Solution	可易適 [®] 泡沫液	0.05%, 25ml/bot

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑性狼瘡。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對本藥 clobetasol propionate、其它皮質類固醇或賦形劑成分過敏者。

◆ **用量與用法：**

請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

使用方法：

1. 使用前請洗淨雙手。

2. **垂直 90° 倒立瓶身**，輕微按壓出適量泡沫於所附的透明瓶蓋內(按壓時勿隨意搖晃瓶身以免高壓氣體噴出)，**不要直接將泡沫噴在手上或身體其他部位**，因為泡沫會因體溫逐漸溶解。如果噴出的泡沫呈現流體水狀，這表示存放產品的地方溫度過高，請將鋁罐放入冰箱冷藏數分鐘(2-3 分鐘)再取出使用即可。



3. 塗抹：以手指取適量泡沫塗於患部並輕柔按摩，直到皮膚都接觸到泡沫為止。

4. 乾燥：塗抹完請清洗雙手，如有未用完的泡沫建議丟棄不用，患部不需沖洗。

◆ **藥品儲存：**

1. 放置於 25°C 以下陰涼處儲存，不要放在日曬處、浴室、廚房、汽車內等高溫處。

2. 使用前後請保持瓶蓋緊閉。

3. 不可長期放在冰箱，低溫會使內容物油水分離並堵塞噴嘴。

4. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 存放地點如溫度過高無法形成泡沫，請放入冰箱冷藏數分鐘(2-3 分鐘)後再重新搖動使用。

2. 罐內除了有效成分還充填了高壓推進氣體，使用時請直接垂直倒立擠出泡沫液即可，勿隨意搖晃，以免過多氣體混入有效成分中同時被擠出。罐內氣體壓力不足會導致無法擠出泡沫液。

3. 當內容物快用完時，擠出的泡沫液就會呈現不完整斷續狀，但罐內仍有殘留液化氣體，請按壓噴嘴排空氣體，空罐可交由垃圾車回收。

4. 封閉包紮容易造成皮膚吸收過量，若無醫師特殊指示請勿用繃帶包紮，若用於嬰幼兒，請注意尿布或衣物通風。

5. 治療超過四週若未再複診則應停止治療；若用於孩童，建議應每週複診由醫師確認後再延續使用。

Clobetasol Propionate 外用製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Clobetasol Propionate	Vimax [®] Foaming Solution	可易適 [®] 泡沫液	0.05%, 25ml/bot

◆ 可能引起的副作用和發生時的處理方法：服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
過敏反應(搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或咽喉腫脹或刺痛、胸悶或呼吸困難)	請停藥，並立即就醫
容易口渴、小便變多、肌肉虛弱、嚴重頭暈和頭痛、頸部、上背部、臉部或腰部有不正常增厚。皮膚變薄、產生皺紋、表皮血管擴張。	嚴重時請停藥，並立即就醫
皮膚起水泡、灼熱感、刺痛、發紅、敏感性增加。傷口癒合能力差。	症狀嚴重或持續時，請告知醫師