

Erythromycin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Erythromycin stearate	Erythromycin® "SHITEH"	紅黴素硬脂酸鹽錠	250 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
用於葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 不要和葡萄柚汁同時服用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對本藥或其他 Erythromycin 類藥物過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 3. 儲存環境：貯存於 25°C 以下室溫，避光、避濕及避熱。
 4. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
 5. 若藥品不再使用或超過有效期限，請拿至醫療場所回收銷毀。
- ◆ **注意事項：**
 1. 延長或重覆使用時，會有易感性之細菌或黴菌增殖之可能率，若病況變差或有感染的徵兆如發燒等，請立即停藥就醫。
 2. 服藥後若發生嚴重的腹瀉，請立即停藥就醫。
 3. 服藥後若發生心律不整情形，如心跳不規則、心跳變快或變慢、心悸、胸悶、胸痛、突然感覺心臟的跳動或撞擊，請回診告知醫師。
 4. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳或有肝、腎疾病病史，請告知您的醫師。
 5. 為避免藥物交互作用，若有服用任何藥品或保健食品，請先告知醫師。
 6. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示，即使自覺好轉，亦請勿擅自停止服用本藥品。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏、心律不整(心悸、胸悶、胸痛、突然感覺心臟的跳動或撞擊)、嚴重皮疹、昏厥、痙攣、皮膚變黃或尿液顏色變深併有腹痛、嚴重腹瀉。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
食欲減退、噁心、嘔吐、胃絞痛、腹瀉、口腔疼痛、陰道搔癢及有分泌物。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/12/3 修訂】

BTC00EC04-02