

Tofacitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tofacitinib	Xeljanz®	捷抑炎膜衣錠	5 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 類風濕性關節炎。
2. 乾癬性關節炎。
3. 潰瘍性結腸炎。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 本藥請整粒吞服，若無法吞服可將藥品磨粉後立即使用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品或其賦形劑過敏者。
2. 懷孕婦女。
3. 若有嚴重感染時，應暫時停止服用本藥，直到感染獲得控制。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥期間，若有需要施打疫苗，請告知您的醫師或醫療人員有在使用本藥，並避免施打活性減毒疫苗 (如卡介苗、水痘疫苗、皰疹病毒疫苗、麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗)。
2. 服用本藥可能會免疫力降低，增加感染的風險，應注意是否出現感染的徵兆及症狀。
3. 若您為腎臟病患者、慢性肝炎(B 肝、C 肝)、肺結核、間質性肺炎或癌症病史的患者，請告知您的醫師您有服用本藥。
4. 若您在服用本藥期間有計畫懷孕，請提前告知醫師。
5. 建議在治療期間及服用本藥後至少 18 小時內不要餵哺母乳。
6. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
不明原因發燒、咳嗽、流鼻水等感冒症狀、泌尿道感染、腹部抽痛、產生血便、胸痛、呼吸困難、茶色尿、皮膚或眼睛變黃。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛。