

Tegafur/Uracil 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tegafur + Uracil	Ufur	友復膠囊	T 100 毫克+ U 224 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療癌症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 食物會影響本藥與葉酸(folate)之合併治療效果，若您有合併使用葉酸(folate)，請勿於飯前 1 小時內或飯後 1 小時內服藥。
3. 無法吞服可將膠囊內容物倒入水中並立即使用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對活性成分或對任何賦形劑產生過敏反應。
2. 嚴重骨髓抑制之患者。(骨髓抑制之惡化可能會引起嚴重之感染合併症之發生。)
3. 嚴重腹瀉之患者。(腹瀉可能會惡化，引起脫水、電解質不平衡、或循環功能異常。)
4. 嚴重感染合併症之患者。(骨髓抑制可能會引起感染情形惡化。)
5. 正在接受 Tegafur、Gimeracil、Oteracil potassium 配合劑或停止使用這類藥物 7 日內的患者。
6. 懷孕婦女或可能懷孕之婦女。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 若想起時距離應服藥時間未滿用藥間隔的 1/2，則應儘速補吃。之後按時服用下個劑量。
2. 若想起時距離應服藥時間超過用藥間隔的 1/2，則不用補吃。按時服用下次劑量即可，切勿服用 2 倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥期間應避孕及勿授乳。若計畫懷孕或授乳，請先告知醫師。
2. 可能會發生骨髓機能抑制等嚴重的副作用，應定期回診做血液、肝、腎功能等臨床檢查。
3. 可能會使血球減少，應注意感染症狀及出血傾向，若持續發燒、喉嚨痛、不明原因淤青、出血情形增加等，請立即回診。
4. 可能會導致嚴重腹瀉、脫水，應適時補充水份及電解質。
5. 若心臟疾病史、肝、腎功能不佳、葡萄糖耐受性異常者，請先告知您的醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
無食慾、腹瀉、噁心、嘔吐、皮膚癢。
2. 如有以下症狀時，請立即就醫
嚴重皮膚疹、感染症狀(發燒、咽頭痛、倦怠感等)、肝功能變差(食欲不振、倦怠、茶色尿、皮膚或眼睛變黃)、嚴重腹痛、嚴重腹瀉或脫水症狀、胸痛、呼吸困難、心悸、昏厥、意識

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/11/27 修訂】

BTC00ED13-02

Tegafur/Uracil 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tegafur + Uracil	Ufur	友復膠囊	T 100 毫克+ U 224 毫克/錠

障礙、嗅覺缺失、嚴重口內炎、血便、血尿。



該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/11/27 修訂】

BTC00ED13-02