

## Fenofibrate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Fenofibrate	Lipanthyl®	弗尼利脂寧膜衣錠	160 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 降低血中的膽固醇與三酸甘油酯：減少心血管疾病及中風的發生率

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 食物可以增加藥物的吸收，請於飯後服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥過敏者
2. 嚴重腎功能不全者。
3. 嚴重肝功能不全及有膽囊疾病者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥請勿與酒精併用，可能會增加藥品的副作用
2. 服藥期間若發生不明原因的肌肉疼痛、無力，伴隨疲倦、虛弱、不明原因的發燒，請立即回診就醫。
3. 有肝、膽、腎疾病病史、已懷孕或計畫懷孕、哺乳婦女、或甲狀腺功能低下，請先告知您的醫師。
4. 若現在正在服用降血脂藥、抗凝血藥、降血糖藥，請先告知醫師或藥師。
5. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血脂。
6. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

不明原因的肌肉疼痛、無力，伴隨虛弱、不明原因的發燒。

發燒、寒顫、嚴重喉嚨痛等感染的情形。

皮膚或眼睛變黃、嚴重嘔吐、茶色尿、糞便顏色變淺。

蕁麻疹、皮膚紅疹。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

味覺改變、便秘、睡眠障礙、頭暈、頭痛、食慾不振、噁心嘔吐，皮膚對光的敏感性增加。