

Multaq® 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Dronedarone	Multaq®	脈泰克膜衣錠®	400 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

治療心律不整，可降低因發生心血管疾病而住院的風險。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. 食物可以增加本藥品的吸收，藥錠請與早餐或/和晚餐一起吃。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知會對活性成分或對任何賦形劑產生過敏反應。
2. 第 2 或第 3 級房室傳導阻滯、完全性束支阻斷、遠端阻斷、竇房結功能障礙、心房傳導缺陷，或病竇症候群之患者(使用功能性節律器者除外)。
3. 心搏過慢每分鐘低於 50 下者。
4. 心房顫動持續六個月以上之永久性心房顫動患者，且醫師不再認為可恢復竇性節律之患者。
5. 有症狀的心衰竭患者且最近曾因心臟代償不全而住院或紐約心臟學會分類為第四類之患者。
6. 心電圖異常醫師判定為無法使用者。
7. 嚴重肝功能不全。
8. 曾發生與 amiodarone 相關的肝臟或肺臟毒性之患者。
9. 孕婦禁用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

若您忘記服用某次劑量，且距離您一般服用劑量的時間未滿原先用藥間隔時間之 1/2，則應儘速隨餐服用忘記的劑量。之後則依據一般時間，隨餐服用下個劑量，切勿服用雙倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：存放在 30°C 以下。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 如有服用抗黴菌劑、利尿劑、抗精神病藥物、三環抗憂鬱劑、某些口服的巨環類抗生素、抗心律不整藥物、抗凝血劑、或其他中草藥，請先告知醫師。
2. 本藥會對胎兒造成傷害，服藥期間請避孕，如計畫懷孕或哺乳請先告知醫師。
3. 服用本藥須定期做血液、心臟、肝腎功能及相關生理檢查。
4. 避免飲用葡萄柚汁飲料

◆ **本藥可能引起哪些副作用？**

1. 若出現心衰竭的症狀或徵兆(例如，體重增加、依賴性水腫、或呼吸急促的情況增加)，應立即停藥就醫。
2. 如發生任何可能的肝臟損傷的徵兆(如：厭食、噁心、嘔吐、發燒、心神不寧、疲倦、右上腹不適、黃疸、深色尿液或皮膚搔癢等)，應立即停藥就醫。
3. 肺部不良反應：如有呼吸困難或乾咳等症狀，請告知醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/11/19 修訂】

BTC00EF61-02

Multaq® 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Dronedaron	Multaq®	脈泰克膜衣錠®	400 毫克/錠

4. 心電圖異常(QT 間隔延長)：服藥期間應定期回診接收心電圖檢查。
5. 腎功能損害：服藥期間應定期回診監測腎功能。
6. 其他副作用：過敏反應、心搏徐緩，如持續且嚴重請回診告知醫師。



該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/11/19 修訂】

BTC00EF61-02