

Lovastatin/Niacin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lovastatin/Niacin	Linicor®	理脂膜衣錠	L500+N20 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療高血脂症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 本品為緩釋劑型，服用此藥物不應壓碎或咀嚼，應整粒吞下。

3. 葡萄柚汁會抑制本藥的代謝，應避免和葡萄柚汁一起服用。

4. 不建議空腹使用，睡前使用時可併服低脂點心。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知對本藥任一成分過敏、有活動性肝臟疾病、肝臟酵素 (transaminases) 持續升高而且原因不明、有活動性的消化性潰瘍疾病或動脈出血的病患。

2. 不宜併用強力 CYP3A4 抑制劑如，itraconazole、ketoconazole、posaconazole、HIV 蛋白酶抑制劑、boceprevir、telaprevir、erythromycin、clarithromycin、telithromycin 與 nefazodone，否則可能造成肌肉病變或橫紋肌溶解症。

3. 已懷孕、計畫懷孕或哺乳的病人應避免使用此藥物。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 除了藥物治療外，應同時進行飲食控制、運動控制、過重者先減重來控制血脂。

2. 若有黃疸、肝膽疾病或消化性潰瘍病史，治療時應密切觀察，監控肝功能及血糖確保不會造成這些器官系統的不良反應。

3. 若發生任何肝損傷的症狀，如疲倦、厭食、腹部不適、深色尿液、黃疸，應立即停藥就醫。

4. 若出現不明原因的肌肉疼痛、觸痛或無力，應立即停藥就醫。

5. 潮紅為 niacin 常見副作用，使用數週後會減緩其發生，此不適症狀可能會發生在睡眠期間，有服用降血壓的患者若起床時感到潮紅不適應慢慢地起來，減緩頭昏眼花或暈厥症狀。

6. 服藥期間避免同時使用酒精、熱飲、辛辣食物以減少臉潮紅反應。

7. 若有服用維他命或其他營養補充物 niacin 或 nicotinamide 應主動告知醫師。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

不明原因肌肉疼痛，肌肉無力症狀，肝功能異常症狀如疲倦、厭食、右上腹不適、深色尿液、黃疸、嚴重皮膚起疹發炎及過敏。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

皮膚搔癢，皮膚潮紅、噁心、腹瀉、頭痛。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/11/19 修訂】

BTC00EF62-02