

Ramipril 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ramipril	Tritace®	心達舒錠	10 毫克/錠

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 治療高血壓或心肌梗塞後的心衰竭。
2. 降低因心血管疾病導致的心肌梗塞、中風及死亡的危險。

◆ **用量與用法：**

請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對於本藥或其他血管收縮素轉化酶抑制劑或任一賦型劑過敏。
2. 具有血管神經性水腫病史者。
3. 單一腎臟中雙側或單側，腎動脈血流減少或窄化。
4. 與血流動力學相關的左心室流入或流出障礙者（如主動脈瓣或二尖瓣狹窄）。
5. 低血壓或循環不穩定的病人（可能使血壓降低或腎衰竭）。
6. 使用含 aliskiren 藥物的糖尿病病人或腎功能不全的病人。
7. 使用血管收縮素受體拮抗劑(angiotensin-II receptor antagonists)的糖尿病腎病變病人。
8. 孕婦及授乳婦。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 治療期間出現血管性水腫(臉、四肢、唇、舌頭、聲門或喉頭水腫)，應立刻停藥。
2. 本藥可能會導致血中的鉀離子過高，應多注意且控制含鉀鹽食物(如代鹽)的攝取，可先請教醫師或營養師。
3. 有些不良反應（如血壓下降的癥狀：頭輕感，暈眩）可能會影響注意力集中及反應力，請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
4. 有腎功能不全、嚴重肝功能不全、心臟疾病者請告知您的醫師。
5. 若計畫懷孕或哺乳的婦女，請先告知您的醫師。
6. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。
7. 請定期測量血壓、脈搏速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

血管性水腫出現在臉、四肢、唇、舌頭、聲門或喉頭，光敏感，皮膚起紅疹，上腹部疼痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛，頭暈，乾咳，血壓偏低，胸痛，疲勞無力，心跳異常，腹部不適，噁心，腹瀉，嘔吐，肌肉痛。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/11/20 修訂】

BTC00EF63-02