

Donepezil HCl 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Donepezil HCl	Aricept OD	愛憶欣口崩錠	10mg/ Orodispersible tab

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療阿茲海默症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次或使用天數。
2. Aricept 口崩錠應於晚上服用，可單獨服用或與食物一起服用。
3. 將藥錠放置於舌頭上，待其崩散後，再用水配服。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對 Donepezil hydrochloride 或 piperidine 衍生物有過敏反應之病人禁用。

◆ **忘記用藥時該如何處理？**

若您是規律性的服用此藥，則請於忘記服藥時立即服藥。但若已接近下次服藥時間時，請直接服用下次之劑量即可，切勿於短時間內服用兩次劑量。

◆ **注意事項：**

1. 若要進行麻醉、消化性潰瘍、氣喘或慢性肺阻塞性肺病、癲癇病史、排尿困難等請告知醫師，由醫師評估是否可使用。
2. 此藥會增加胃酸分泌，應小心觀察病人是否有急性或隱藏性胃腸道出血，尤其有潰瘍病史或同時併用非類固醇抗發炎藥物之病人。
3. 此藥物使用在懷孕婦女其安全性尚未確立，若已計畫懷孕或已懷孕或正在哺乳，就診時請務必告知醫師，由醫師評估是否可使用。
4. 此藥會造成步態不穩、易跌倒，必須特別小心。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

症狀	處理方法
在服藥初期可能會造成腹瀉、噁心及嘔吐	繼續服用 1~3 週後症狀會改善，不必調整劑量或停藥。如症狀持續且嚴重，請於回診時告知醫師。
發燒、肌肉或關節痛、意識改變、心跳過慢或心跳不規則	請立即就醫

◆ **藥品儲存：**

1. 請置於室溫 30°C 以下保存，避免存放於高溫或潮濕處。
2. 請將藥品存放於兒童不易取得之處所。