

Valproate sodium 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Valproate sodium	Depakine	帝拔癲持續性藥效膜衣錠	500mg/tab

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療或預防癲癇發作。
2. 治療躁病。
3. 預防偏頭痛。

◆ **用量與用法：**

1. 請按照醫生指示服藥，不可擅自增減劑量或突然停藥。
2. 本藥為長效劑型，可以撥半後吞服，但不可以咀嚼或研碎服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對 Valproate、Divalproate、Valpromide 過敏或本藥其他成份過敏者。
2. 急性、慢性肝炎患者、有嚴重肝炎之個人或家族病史者，特別是藥物引起的肝炎。
3. 肝性紫質症(Hepatic porphyria)。
4. 尿素循環代謝異常者。
5. 禁與 Mefloquine、聖約翰草合併使用。

◆ **藥品儲存：**

存放於室溫(25°C 以下)且乾燥的地方，並放在兒童不易觸及地方避免誤食。

◆ **注意事項：**

1. 可能影響駕車及機械操作能力，請小心。
2. 若發生藥物過敏或有皮膚症狀時，請立即停藥及就醫。
3. 請定期回診做肝功能檢測。
4. 三歲以下孩童若需使用本藥，需注意發生肝炎與胰臟炎的危險性，且避免水楊酸類藥物併用。
5. 一旦開始治療，請做好避孕措施。(懷孕或計畫懷孕婦女請提前告知您的醫師)
6. 建議治療時不要授乳。
7. 應注意自殺行為風險。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 以下症狀持續，請回診告知醫師：

體重增加、噁心嘔吐、精神混亂或癲癇發作、血小板缺乏症、掉髮、輕微顫動、昏昏欲睡。

2. 若發生以下症狀，請盡速回診：

嚴重的皮膚反應(Stevens-Johnson 症候群)、嚴重肝功能異常、黃疸、導致昏昏欲睡不適、反覆性嘔吐與腹痛等症狀時。