

Entecavir 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Entecavir	Baraclude®	貝樂克膜衣錠	0.5 毫克/錠, 1 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療 B 型肝炎。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 應於飯前 2 小時或飯後 2 小時空腹服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品成分過敏的病人。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：置於 30°C 以下，避光、避濕及避熱處所。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 治療期間須按時服藥，不可擅自停藥，應依處方完成療程，以確保療效。

2. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳婦女，請告知您的醫師。

3. 若有肝臟疾病、腎臟疾病，請告知您的醫師。

4. 服藥期間及停藥數月後，仍應持續按時回診追蹤檢查，並監測肝功能。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重過敏反應(蕁麻疹、呼吸困難)、極度疲倦、皮膚或眼球變黃。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、頭暈、感覺疲勞、噁心、嘔吐、腹瀉。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/12/1 修訂】

BTC00EK25-02