

Di octahedral Smectite 口服懸液用粉劑衛教單張

商品名	中文名
Smecta® Powder	舒腹達粉劑

◆ **組成：**

每袋含主成分 Di octahedral Smectite 3 g

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 治療 2 歲含以上兒童（併用口服脫水補充液）及成人之急性腹瀉。
2. 症狀性治療成人的慢性功能性腹瀉。

◆ **用量與用法：**

1. 請依醫師指示服用，切勿自行更改藥量。
2. 藥粉應於使用前才將其混合成懸浮液，每袋以 50ml 水混勻後服用。
3. 若為兒童，藥粉以 50 ml 的水或與半流體食物混合，如肉湯、果泥、菜泥、嬰兒食品。

◆ **藥品儲存：**

1. 存放於乾爽地方，不要超過盒上指明的日期。請擺放在遠離兒童的地方。
2. 儲存於 30°C 以下

◆ **注意事項：**

1. 本品的吸附作用可能干擾其他藥物的吸收與排除，應盡量避免與他藥品同時使用，如需服用其他藥物，建議與舒腹達間隔一段時間（盡可能間隔 2 小時以上）。
2. 腹瀉應補充大量含糖或含鹽的流體，以彌補腹瀉所導致的體液流失（成人平均每日需 2 公升水分）。
3. 本品含有葡萄糖和蔗糖，有果糖不耐受症、葡萄糖和半乳糖吸收不良症候群、或蔗糖酶/異麥芽糖酶缺乏症之病人不建議使用。
4. 過量可能導致嚴重便秘或結石。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

便秘，若發生表示藥品過量，請暫時停用。