

### **Folic acid** 口服製劑衛教單張

| 學名         | 商品名      | 中文名   | 含量/劑型  |
|------------|----------|-------|--------|
| Folic acid | Folacin® | 葉酸膜衣錠 | 5 毫克/錠 |

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 葉酸補充：葉酸是維持身體生長及健康的必要維生素之一，通常自食物中即可取得，缺乏時可能會導致貧血。
2. 治療因葉酸缺乏引起之巨細胞性貧血、嬰兒巨初紅血球性貧血、孕婦惡性貧血(可能造成胎兒神經管缺損)。

◆ **用量與用法：**

請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次或使用天數。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對本藥或其所含賦形劑過敏者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 貧血病因未明前不宜自行服用此藥，應先找醫生作診斷。
2. 平常可多服用一些富含葉酸的食物，如水果(柳橙)、綠色蔬菜(菠菜)、內臟(肝、腎)、穀類或是以乾乳酪製成的麵包等。
3. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女，或有其他病史，請告知您的醫師。
4. 若有正在服用抗癲癇藥 phenytoin (如 Dilantin 癲能停膠囊)，葉酸可能減低抗癲癇藥的血中濃度，而影響癲癇症的控制。因此有服用 phenytoin 及其他處方或非處方的用藥，請先告知醫師。
5. 若您正在服用可利舒散(Choles powder)，則應在服用此藥物之前或之後至少 4 小時服用葉酸。
6. 長期服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
7. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
皮膚過敏、癢或紅腫、癲癇發作、呼吸短促或困難。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
食欲不振、噁心、苦味感、躁動、混亂。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/12/4 修訂】

BTC00EL03-02