

## Levothyroxine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Levothyroxine	Eltroxin®	昂特欣錠®	50 微公克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療甲狀腺機能減退症或抑制甲狀腺腫。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

2. 食物會影響本藥品的吸收，因此建議飯前使用，通常一天一次，早餐飯前服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品過敏者。

2. 腎上腺機能不足患者。

3. 甲狀腺毒症：如甲狀腺素分泌過多等。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥可能會使血糖升高，擾亂血糖穩定度，糖尿病患者服藥期間應密切監測血糖。

2. 服用本藥可能會加抗凝血劑的作用，使用抗凝血劑患者服藥期間應小心有無異常出血情形。

3. 若同時使用制酸劑、或含鈣或鐵的藥物，至少間隔 4 小時。

4. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

5. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、心血管疾病、糖尿病的患者，請告知您的醫師。

6. 若有正在服用強心劑、抗凝血劑、抗癲癇藥物、降血脂藥物、口服避孕藥等，請告知您的醫師。

7. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重過敏反應、胸痛、呼吸困難、脈搏太快或不規律、癲癇或震顫

兒童：嚴重頭痛、視力模糊、噁心、嘔吐、跛行併膝關節或寬關節疼痛

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

食慾或體重改變、月經週期改變、腹瀉、掉髮、肌肉痙攣或無力、易發熱、睡眠障礙、體重減輕。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150 【2020/11/26 修訂】

BTC00EM32-02