

## Ergonovine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ergonovine maleate	Ergometrine®	縮水蘋果酸麥角新鹼片	0.2 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
預防或治療產後之子宮出血及分娩時之子宮弛緩出血、促進產後子宮之復元、及預防出血過多。
- ◆ **用量與用法：**  
請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥，直到渡過子宮弛緩出血的危險期，通常為 48 小時。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 對本藥或其所含賦形劑過敏者。
  2. 用於誘發分娩或自然流產。
  3. 懷孕婦女。
  4. 有服用強力肝臟酵素抑制劑者，如 Azole 類抗黴菌藥(Diflucan®泰復肯膠囊、Sporanox®適撲諾膠囊)、Macrolides 抗生素(zithromax®日舒錠劑、Klaricid®開羅理黴素膜衣錠)等。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**  
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 若服藥後子宮仍持續出血，請回診就醫。
  2. 服藥期間，請監測血壓、脈搏速率，尤其是高血壓或有心血管疾病史的病人。
  3. 若要哺乳的婦女，肝、腎功能不全、有心臟血管疾病、心絞痛、中風病史、感染或雷諾氏症候群(Reynaud's phenomenon：一種末梢循環不良，一遇冷末梢肢體就變白變紫的自體免疫疾病)等其他病史，請告知您的醫師。
  4. 若有正在服用 Bromocriptine、其他麥角類生物鹼、心絞痛等其他處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
胸痛、視力模糊、癲癇發作、嚴重且忽然性的頭痛、心跳不規則、呼吸短促、嚴重的噁心嘔吐、四肢發紫。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、頭暈、鼻塞、高血壓、心跳徐緩、皮膚癢、手、腳、下背部疼痛、蒼白、手腳冰冷、腳虛弱。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/12/3 修訂】

BTC00EP02-02