

Diethylamine salicylate/Esцин/Heparinoid gel 衛教單張

商品名	中文名
Esarin® gel	礙沙凝膠

◆ 組成：

1. 總重 20 克，每克藥膏含 Diethylamine salicylate 50 毫克/Esцин 10 毫克/Heparinoid 10 毫克。

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 慢性靜脈功能不全之輔助改善及創傷後之疼痛緩解。

◆ 使用方式：

1. 塗一薄層於皮膚受害部位，一天一次或多次，此藥不必按摩使滲入皮膚內，但如想這麼做的話也可以。
2. 當處理潰瘍時，僅適於塗擦在潰瘍周圍的皮膚上。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對此藥成分過敏之患者。

◆ 忘記用藥時該如何處理？

1. 想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，千萬不可使用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存於 30°C 以下無陽光直射的陰涼處。

◆ 注意事項：

1. 置於小孩不易取得處。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
發生全身性過敏症狀。
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
患部刺激性、紅腫或發熱。