

## Atorvastatin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Atorvastatin	Tulip®	妥寧膜衣錠	20 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 降低血中的膽固醇及三酸甘油脂：減少心血管疾病及中風的發生率。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任何成份過敏者。
2. 有活動性的肝疾病，肝臟酵素持續升高超過正常上限值三倍以上者。
3. 懷孕婦女及授乳婦女。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥不可與葡萄柚汁或酒精併用，可能會增加藥品的副作用。
2. 服藥期間若發生不明原因的肌肉疼痛、無力，伴隨疲倦、虛弱、不明原因的發燒，請立即回診就醫。
3. 若服藥期間發現懷孕，應立即停藥，並儘速就醫；哺乳婦女也應停止使用本藥。
4. 使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請諮詢醫師或藥師。特別是若正在服用其他類的降血脂藥(如本院的 Choles® 可利舒散、Lipanthyl® 弗尼利脂寧、Lopid® 洛脂)、抗凝血藥(Warfarin®)、免疫抑制劑(cyclosporin®，如本院的 sandimmun NEORAL® 新體睦軟膠囊)、強心劑(digoxin，如本院的 Lanoxin® 隆我心)等，請告知醫師或藥師。
5. 有肝、腎疾病、心臟疾病、痙攣疾病病史、近期內將進行手術者請告知醫師。告醫知是否患有糖尿病，感染，低血壓，肌肉疼痛或無力，癲癇發作，甲狀腺問題，最近發作的中風或 TIA(短暫性腦缺血發作)或有肝病。告訴醫生是否經常喝酒。
6. 若要進行外科手術，包括牙科手術，請先告知醫師正在服用本藥。
7. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。
8. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血脂。
9. 自行停藥可能會導致無徵兆的病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

過敏。起泡，脫皮，紅疹。排尿的頻率或頻率改變。尿色深或大便白，噁心，嘔吐，食慾不振，胃痛，皮膚或眼睛發黃。發熱無法解釋的肌肉疼痛，壓痛或無力。不尋常的疲倦。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

手臂，腿部或關節疼痛。腹瀉。鼻塞或流鼻涕。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/6/4 修訂】

BTC00EF05-02