

### Imidapril 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Imidapril	Tanatril®	田納滋錠	5 毫克/錠

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療高血壓：可使血流順暢，要長期且按時服用，才能確保療效。

◆ 用量與用法：

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥或其他同屬於血管收縮素轉化酵素抑制劑類(angiotensin converting enzyme inhibitor)藥物過敏者。

2. 原發性或自發性的血管水腫疾病。

3. 懷孕婦女。

4. 雙邊腎動脈狹窄症患者。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項：

1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。

2. 若服藥期間發現懷孕，應立即停藥，並儘速就醫。

3. 計畫懷孕、哺乳的婦女、有心臟、肝、腎疾病病史者，請告知您的醫師。

4. 本藥可能會導致血中的鉀離子過高，應多注意且控制含鉀鹽食物(如代鹽)的攝取，可先請教醫師或營養師。

5. 自行停藥可能會導致病情惡化，因此未經醫師指示請勿擅自停止服用本藥品。

6. 服用本藥應避免和酒精或大蒜、人參併用，可能會影響藥物的療效。

7. 請定期測量血壓、脈搏速率及注意身體狀況，以作為醫師調整藥物的依據。

8. 請定期至醫院就診及檢查，以確保藥物療效及用藥安全。

9. 除藥物治療外，同時應配合飲食控制及適度的運動來控制血壓。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

皮膚癢或紅疹、臉部四肢水腫、呼吸或吞嚥困難、聲音嘶啞。

昏厥、發燒、喉嚨痛。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

乾咳、頭痛、頭暈、疲倦感、腹瀉。

噁心：和牛奶或食物並服可改善之，若仍無法改善，請告知醫師。