

Torsemide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Torsemide	Torsix®	妥速適錠	5 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 - 1 與充血性心衰竭，肝腎疾病，包括腎病症候群相關的水腫。
 - 2 高血壓。
- ◆ **用量與用法：**
 - 1 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 - 2 本藥為利尿劑，服用藥物後會增加排尿次數，為避免影響睡眠品質，除非醫師有特別指示，建議於晚上 6 點前服用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 - 1 對本藥任一成份或 sulfonamides 類藥品(如 Baktar® 撲菌特錠)過敏者。
 - 2 持續無尿。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 - 1 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 - 1 儲存環境：25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 - 2 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥後可能會發生嗜睡、頭昏、暈眩。避免開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
 2. 服藥後可能會有姿勢性低血壓情形發生，即從坐姿或躺姿站起來時，會有頭暈目眩的情形。因此站起來時，應儘可能的放慢速度。
 3. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳、有心血管疾病、肝、腎功能不良、胰臟炎、糖尿病、痛風或紅斑性狼瘡等其他病史，請告知您的醫師。
 4. 如要使用非類固醇消炎止痛藥，請先諮詢您的醫師或藥師。
 5. 有使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)之前請先告知醫師。特別是非類固醇消炎止痛藥、阿斯匹靈、其他利尿劑、抗毛地黃、鋰鹽。
 6. 請定期至醫院就診及檢查，以維持體內電解質的平衡及定期監測腎功能，以確保藥物療效及用藥安全。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏。起泡，脫皮，紅疹。聽力下降或耳鳴。頭暈或昏厥。肌肉痙攣，排尿困難，發燒，發冷，咳嗽，一側或腰部疼痛。嚴重腹瀉或胃痛。食道出血。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭暈、頭痛、噁心、衰弱、嘔吐、高血糖、尿液過多、高尿酸血症、低血鉀症、口乾、過渴症、性功能障礙、消化不良。