

Desloratadine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Desloratadine	Denosin®	停敏錠	5 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 季節性過敏性鼻炎引起的相關症狀，緩解慢性原發性蕁麻疹相關症狀。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對 Desloratadine 或 loratadine 過敏。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您已習慣藥物對您的影響。
 2. 服用本藥請勿飲酒。
 3. 懷孕或準備懷孕、哺乳、肝腎心臟疾病、腸胃道疾病，請先告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重過敏：蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
快速或不規則的心跳；排尿時疼痛，或排尿困難；皮膚或眼睛變黃。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
發燒、咳嗽、喉嚨痛或頭痛；嗜睡、頭暈、緊張或其他情緒變化；口乾或喉嚨乾燥；噁心、腹瀉、胃部不適；輕度皮疹；肌肉疼痛。