

## Flunarizine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Flunarizine	Suzin®	舒腦膠囊	5 毫克/膠囊

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
眩暈、動暈症、末梢血管循環障礙、偏頭痛的預防。
- ◆ **用量與用法：**  
請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 曾經對本藥任一成分過敏者。
  2. 有抑鬱病史之患者。
  3. 目前有帕金森氏症或相關症狀之患者。
  4. 有錐體外症狀之患者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**  
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 常見副作用為嗜睡，特別是在治療初期，因此若預期要開車、從事具危險性的活動或操作機械時須小心。
  2. 服藥期間請避免飲酒。
  3. 如目前正在使用安眠藥及鎮靜劑，請告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮疹、呼吸困難、原因不明發燒等)、  
運動遲鈍、口部及顏面運動僵硬/失調、震顫、抑鬱。
  2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
嗜睡、噁心、胃痛、疲倦、口乾、食慾及體重增加。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/6/25 修訂】

BTC00EA07-02