

Meclizine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Meclizine	Meclizine®	美克旅鎮片	25 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
用於頭暈或動暈症(暈車、暈船、暈機)的不適症狀。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 預防暈車、暈船、暈機時，於搭乘前 30 ~ 60 分鐘服用。
 2. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 曾對本藥成分過敏者。
 2. 有青光眼、前列腺肥大、排尿困難之病人。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥後，可能會引起嗜睡、倦怠感，若預期要開車、從事具危險性的活動、或操作機械時須小心。
 2. 老年人比較容易發生副作用，如嗜睡、視力模糊、散瞳、尿液滯留、口乾、便秘、意識混淆、認知改變等，請小心使用。
 3. 服藥期間請避免飲酒。
 4. 如有呼吸系統問題或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難者，請先告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮疹、呼吸困難、原因不明發燒等)。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
思睡、倦怠感、口乾、視野模糊、頭痛。