

P.P.C. 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Acetaminophen Dexchlorpheniramine Ethenzamide Caffeine	P.P.C. capsule	必克風膠囊	A 120mg D 1.17mg E 300mg C 50mg

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、發燒、頭痛，關節痛，肌肉痛)。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
 2. 不得併服含酒精飲料
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 苯酮尿患者
 2. 對 acetaminophen (普拿疼)或其他成分過敏者
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本劑後，駕車或操作危險器械時要小心。
 2. 本藥含咖啡因，請勿再服用含咖啡因藥品、飲料(如茶、咖啡、可樂等)，過多的咖啡因會引起精神緊張、興奮與失眠，且常會引起心搏過速。
 3. 請勿服用超過7天。服用後若症狀無改善且併發燒超過3天者應立即停藥就醫。
 4. 若咳嗽持續達一星期以上，或若有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛，應停藥立即就醫
 5. 若喉嚨疼痛持續二天以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐，應停藥立即就醫。
 6. 吸煙、慢性阻塞性肺疾，如氣喘、慢性氣管炎或肺氣腫所引起之持續或慢性咳嗽患者、青光眼、肺氣腫、呼吸急促或呼吸困難、因前列腺腫大引起之排尿困難者，請先告知醫師。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重過敏、噁心、嘔吐、食慾不振、頭暈、耳鳴、喉嚨疼痛、心跳加快、排尿困難、視覺模糊等症狀時。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
嗜睡、口乾、倦怠感、神經質、興奮、失眠、心跳過速。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/06/25 修訂】

BTC00EA13-02