

## Tocilizumab 注射筆 衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tocilizumab	Actemra® 162mg for SC Injection	安挺樂® 皮下注射劑	16 毫克/0.9 毫升/筆

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 類風濕性關節炎。
2. 成人巨細胞動脈炎。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本品過敏之患者。

◆ **藥品儲存：**

1. 冷藏 2°C 到 8°C，不可冷凍。置於外盒內避免光照，直到注射前再取出。

◆ **用量與用法：**

1. 皮下注射使用，不可用於靜脈輸注。
2. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
3. 此注射筆限單次注射使用，使用後應予以丟棄。

**注射部位：**大腿、腹部(距肚臍 2-3 指幅之外的區域)、上臂。每次更換注射部位。勿注射於痣斑、疤痕、觸痛、瘀傷、發紅、變硬或破損的皮膚部位。

**使用步驟：**


1. 由劑量窗口檢查液體是否澄清、無色至淡黃色且無顆粒，若出現紫色實線請勿使用(如右圖)。
2. 注射筆放在室溫下 **30 分鐘回溫**。注射筆不可加熱或以其他式加溫，請讓其自行回溫，回溫後請儘速使用，勿再放回冰箱。
3. 以肥皂及清水洗淨雙手並擦乾。
4. 以酒精棉片清潔注射部位的皮膚。
5. 旋開綠色筆蓋，並於 **3 分鐘內注射**。
6. 緊握注射筆並將其壓入注射部位直到紫色安全蓋看不見為止(如右圖)。若紫色安全蓋沒有完全壓入，此注射筆無法使用。如有必要，可捏住皮膚以固定注射部位。
7. 以大拇指壓下綠色按鈕，聽到喀一聲後注射筆開始注射(劑量視窗會逐漸轉變為紫色)，注射期間可能會聽到第二聲喀聲，繼續注射直到劑量視窗完全變成紫色，注射時間有可能長達 10 秒。

**注意：**整個劑量視窗尚未完全變成紫色前請勿移開注射筆。

8. 注射完成後移開注射筆，勿搓揉注射部位。注射筆不需套回綠色筆蓋，丟入防穿刺的容器內。

◆ **注意事項：**

1. 一支筆型供應一次用量，使用前需靜置回溫至室溫，勿對藥品加熱。
2. 注射時注意手不要擋住藥液視窗(劑量視窗)，聽到喀一聲，眼睛注視藥液視窗(劑量視窗)，



## Tocilizumab 注射筆 衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tocilizumab	Actemra® 162mg for SC Injection	安挺樂® 皮下注射劑	16 毫克/0.9 毫升/筆

藥品注入身體後視窗漸漸變紫色，當劑量視窗完全變成紫色後表示注射完成，此時才可以將藥品移開皮膚。

3. 本藥會降低抵抗感染的能力，若有疑似感染的症狀，請立即就醫。
4. 本藥可能會對胎兒造成傷害，若計畫、疑似、或確定懷孕，請告知醫師。
5. 治療期間不可施打活性疫苗，可能的話，在接受本藥治療前，應先接種所有建議的疫苗，尤其是老人及幼兒。
6. 極少數病人可能會發生胃腸穿孔，若發生嚴重且持續性的腹痛、血便、黑便、腹瀉，請立即就醫。

### ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

#### 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

全身性過敏、蕁麻疹；發燒、寒顫、上呼吸道感染；持續性的腹痛、血便、黑便、腹瀉；食慾降低、腸胃不適、噁心嘔吐、茶色尿、皮膚或眼睛變黃；。

#### 1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

注射部位紅腫；口咽疼痛、流鼻水、打噴嚏；頭痛；高血壓。