

## Alirocumab 注射筆 衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Alirocumab	Praluent® solution for injection	保脂通® 注射劑	75mg/pen

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 高膽固醇血症：用於降低血液中的膽固醇，可作為飲食外的輔助治療。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本品過敏之患者。

◆ **藥品儲存：**

1. 冷藏 2°C 到 8°C，不可冷凍。
2. 從冰箱拿出後置放於 25°C 以下的時間最多不得超過 24 小時。


◆ **用量與用法：**

1. 皮下注射使用。
2. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
3. 此注射筆限單次注射使用，使用後應予以丟棄。

**注射部位：**大腿、腹部(距肚臍 5 公分之外的區域)、上臂外側。每次更換注射部位。勿注射於壓痛、粗硬、發紅或發熱的皮膚部位。

**使用步驟：**

1. 由劑量窗口檢查液體是否澄清、無色至淡黃色且無顆粒，若有氣泡屬正常現象，若出現黃色實線請勿使用(如右圖)。
2. 注射筆放在室溫下 30-40 分鐘以使之回溫。注射筆不可加熱，請讓其自行回溫，回溫後請儘速使用，勿再放回冰箱。
3. 以肥皂及清水洗淨雙手並擦乾。
4. 以酒精棉片清潔注射部位的皮膚。
5. 拉開藍色筆蓋。(要注射前才可拉開，拉開後請勿再套回)
6. 緊握注射筆並將其壓入注射部位直到黃色安全蓋看不見為止(如右圖)。若黃色安全蓋沒有完全壓入，此注射筆無法使用。如有必要，可捏住皮膚以固定注射部位。



7. 以大拇指壓下綠色按鈕，聽到喀答一聲後鬆開按鈕。此時仍應緊握注射筆並抵住皮膚。

8. 喀答聲後注射筆開始注射(劑量視窗會逐漸轉變為黃色)，聽到第二聲喀答聲表示注射完畢(劑量視窗完全變成黃色)，注射時間有可能長達 20 秒。

**注意：**整個劑量視窗尚未完全變成黃色前請勿移開注射筆。

9. 注射完成後移開注射筆，勿搓揉注射部位。注射筆不可套回藍色筆蓋，丟入防穿刺的容器內。



◆ **忘記施打時該如何處理？**

1. 若漏打每 2 週一次劑量，病患應儘快於漏打後七天內補打該次藥物，並依原注射時程繼續治療。若未能於漏打後七天內補打該次注射藥物，則不須補打，依原注射時程繼續治療。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問  
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150 【2020/11/9 修訂】

BTC00EF54-02

## Alirocumab 注射筆 衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Alirocumab	Praluent® solution for injection	保脂通® 注射劑	75mg/pen

2. 若漏打每 4 週(每月)一次劑量，病患應儘快於漏打後七天內補打該次藥物，並依原注射時程繼續治療。若未能於漏打後七天內補打該次注射藥物，則於發現漏打時補打，並重新開始新的療程。

### ◆ 注意事項：

1. 一支筆型供應一次用量，使用前需靜置回溫至室溫，勿對藥品加熱。
2. 注射時注意手不要擋住藥液視窗(劑量視窗)，聽到喀答一聲，眼睛注視藥液視窗(劑量視窗)，藥品注入身體後視窗漸漸變黃色，注射完會再聽到喀答一聲，此時才可以將藥品移開皮膚。
3. 若同時須施打 2 次劑量，請注射於不同部位。

### ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫  
全身性過敏、蕁麻疹、錢幣狀濕疹。
1. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
注射部位紅腫、口咽疼痛、流鼻水、打噴嚏。