

Buclizine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Buclizine 2HCl tab	Lonzumin®	普治敏錠	25 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 暫時緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻涕、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹、預防或緩解動暈症(暈車、暈船、暈機)引起之頭暈、噁心、嘔吐、頭痛等症狀。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
 2. 預防暈車暈船應於搭乘前 30-60 分服用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 曾因本藥成分引起過敏。
 2. 孕婦。
 3. 3 歲以下。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作。
 2. 服用本藥請勿飲酒。
 3. 老年人比較容易發生副作用，如嗜睡、視力模糊、散瞳、尿液滯留、口乾、便秘、意識混淆、認知改變等，盡量避免使用，如必需使用請小心監測。
 4. 服用本藥前，若有下列事項：懷孕或準備懷孕、哺乳或任何其它醫療問題，請先告知醫師
 5. 若有使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)請先告之醫師，特別是服用鎮靜安眠、鎮暈、綜合感冒、鎮咳祛痰、鼻炎或抗過敏等藥。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重過敏。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
口乾、嗜睡、疲勞、異常興奮(小兒及老年人較常見)、尿液滯留、視力變差、視野變窄、視覺顏色異常。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/7/9 修訂】

BTC00EA14-02