

Diphenidol 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Diphenidol HCl	Diphenidol®	敵芬尼朵糖衣錠	25 克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 內耳障礙引起之眩暈(包括血管障礙及頭頸部外傷引起之眩暈)。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥過敏者。
 2. 重度腎功能障礙者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 服藥後可能會導致嗜睡、頭暈、昏眩，小心開車或操作危險性機械。
 2. 服藥期間請勿飲酒，以避免增加嗜睡、鎮靜的副作用。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
嚴重過敏。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
口渴、胸部灼痛感、散瞳、心悸、發疹、消化不良、頭痛、嗜睡、噁心。