

Valaciclovir 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Valaciclovir	Valtrex®	祛疹易	500 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
用於改善疱疹病毒感染症狀，預防反覆發作。
- ◆ **用量與用法：**
本藥為抗病毒藥物，請遵循醫師指示服用，為達到完全控制病毒複製之目的，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
對 valaciclovir、acyclovir 或製劑中任何一種成分過敏者。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
 1. 本藥並不能完全根除疱疹病毒，因此若感染生殖性疱疹，治療期間仍應避免性行為，或採取安全性行為(如使用保險套)以防止疱疹病毒之傳播。
 2. 治療期間應多補充水分，以減少腎臟副作用發生的可能。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
 - 過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮膚搔癢、紅疹、蕁麻疹、呼吸困難、原因不明發燒等)
 - 意識混亂
 - 躁動、幻覺
 - 皮膚或眼白變黃
 - 排尿量或排尿頻率減少
 - 心悸
 - 異常出血。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛、腸胃不適、噁心嘔吐、腹痛。