

Gefitinib 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Gefitinib	Iressa®	艾瑞莎膜衣錠	250 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
肺腺癌病患之第二線用藥，特定非小細胞肺癌病患之第一線用藥。
- ◆ **用量與用法：**
 1. 按照醫師處方與指示服用。
 2. 通常每天一次，可空腹或與食物併用。
 3. 無法吞服請泡水，不要壓碎，攪拌直到藥物崩散(約 15 分鐘)立刻服用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對艾瑞莎膜衣錠及其所含成分過敏者禁用
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
 1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
 2. 若離下次服藥時間不到 12 小時，請跳過這一次，下次也不可一次服用雙倍藥量。
- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：貯存於 30°C 以下室溫，避光、乾燥處。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
 3. 若藥品超過保存期限或不再使用，請攜至醫療院所回收銷毀。
- ◆ **注意事項：**
 1. 若您目前有服用其他藥物或(曾)有肝臟疾病，請先告知您的醫師。
 2. 女性若有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
 3. 若您有要施打任何疫苗(如：麻疹或流行感冒疫苗)，請先告知您的醫師。
 4. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

可能不良反應包括腹瀉、皮疹或發癢等。

 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
任何眼部症狀、嚴重或持續之腹瀉、噁心嘔吐、食慾不振、呼吸困難、咳嗽及發燒等。
 2. 如以下症狀請勿驚慌，通常發生於治療的第一個月，且通常隨時間會慢慢恢復，若症狀持續嚴重，請告知您的醫師。
腹瀉、皮疹、皮癢、皮膚乾燥及面皰。