

Cyclophosphamide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Cyclophosphamide	Endoxan®	癌德星錠	50 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療惡性淋巴腺腫瘤、白血病、多發性骨髓瘤、乳癌等。
- ◆ **用量與用法：**
根據醫師處方用法服用，請勿擅自更改。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對此藥成分過敏者。
 2. 骨髓功能嚴重受損者。(尤其是曾以化學治療或接受放射性治療的病人)
 3. 膀胱炎、尿道阻塞。
 4. 嚴重感染症，如肺炎、敗血症等。
 5. 懷孕，男性服用亦會影響其性伴侶懷孕胎兒之安全性。
 6. 授乳婦女。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**請儲存於 25°C 以下室溫、避光、乾燥處。
- ◆ **注意事項：**
 1. Endoxan 建議於早上服用，且須整粒吞服，服藥同時或服藥後應飲用大量開水。
 2. 應小心使用於虛弱、年老患者或曾接受放射線治療者。
 3. 免疫系統低下者，如糖尿病患者或慢性肝、腎損傷者，請主動告知醫師。
 4. 若是同時服用其他藥物，請主動告知醫師。
 5. 治療期間應定期監測白血球數目。
 6. 服藥期間避免食用葡萄柚。
 7. 請勿飲酒，會增加副作用發生之風險。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
出血性膀胱炎、血尿、白血球減少。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
噁心、嘔吐、無月經、禿髮。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/6/8 修訂】

BTC00ED15-02