

## Tolterodine 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Tolterodine L-tartrate	Detrusitol SR PR cap®	得舒妥持續性藥效膠囊	4 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療伴有急尿、頻尿或急迫性尿失禁症狀的膀胱過動症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

2. 須以整粒吞服，膠囊不可打開使用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 曾對本藥成分或賦形劑過敏。

2. 尿液滯留。

3. 未控制的狹角性青光眼。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 可能會造成視力模糊、頭昏及暈倦，因此若預期要開車、從事具危險性的活動、或操作機械時須小心。

2. 本藥可能引起口乾症狀，可利用口含碎冰、無糖糖果或咀嚼無糖口香糖緩解。

3. 本藥可能導致流汗量減少，引起身體過熱，若在熱天運動或洗蒸汽浴時應注意。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 過敏反應(如臉、唇、喉嚨腫脹、皮疹、呼吸困難、原因不明發燒等)

- 排尿困難、尿滯留

- 胸痛

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭昏、口乾、便秘、眼睛或皮膚乾澀。