

Digoxin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Digoxin	Lanoxin [®]	隆我心錠	0.25 毫克/錠
	Cardiacin [®] elixir	地高新醃劑	0.05 毫克/毫升 60 毫升/瓶

- ◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
 1. 治療心臟衰竭及心跳節律異常(心律不整)，本藥又稱作 digitalis (毛地黃)。
- ◆ 用量與用法：
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
- ◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：
 1. 對此藥跟其它 Digitalis 配醣體或其任何成分過敏的患者。
 2. 有心室纖維性顫動者。
- ◆ 忘記服藥時該如何處理？
 1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ 藥品儲存：
 1. 儲存環境：隆我心錠劑置於室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
地高新醃劑避光貯存於 25°C 以下，避免陽光直接照射、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ 注意事項：
 1. 服用本藥後可能會發生頭昏、暈眩。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
 2. 服藥期間請注意您的心跳，若過快或過慢時請回診告知醫師。
 3. 服藥期間若發現有視力上的改變，如視線模糊、看到黃色光暈等，請回診告知您的醫師。
 4. 有心臟、肝臟、腎臟、肺臟、甲狀腺疾病病史、電解質異常，請告知您的醫師。
 5. 沒有醫師指示，切勿自行更改劑量或停藥。
 6. 若有正在服用其他抗心律不整藥物、利尿劑、乙形交感神經抑制劑、類固醇等，或其他的處方及非處方的藥品，請告知您的醫師。
 7. 服用本藥須定期至醫院就診及檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
- ◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？
 1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
視力模糊或有黃色視覺；意識混亂不清、虛弱無力、心跳不規則、呼吸急促、呼吸時會痛、手腳嘴唇有麻木刺痛感；嚴重噁心嘔吐、腹瀉、食慾變差。
 2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭暈、頭重腳輕、虛弱、昏厥、輕微發燒、手指(腳趾)麻木、光敏感。
噁心、嘔吐、便秘、腸胃不適：和食物併服可降低此副作用。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/7/21 修訂】

BTC00EF13-02