

Methyldopa 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Methyldopa	Methyldopa®	脈得保糖衣錠	250 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 控制高血壓：要長期且按時服用，才能確保療效。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥過敏者。
2. 正在服用單胺酶抑制劑(monoamine oxidase inhibitor)，如 moclobemide。
3. 急性肝炎或肝硬化急性期之病人，或曾因本藥導致肝臟異常之病人。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩，尤其是第一次服用本藥，或從坐姿、躺姿站起來時，所以變換姿勢時應緩慢，並注意跌倒。服藥後請勿開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
2. 飲酒或服用鎮靜劑，都可能會增加嗜睡的副作用，增加頭暈甚至暈倒的情形發生。服藥期間應避免飲酒。服用其他藥物前，可先詢問醫師或藥師此藥物是否有鎮靜作用。
3. 老年人比較容易有副作用發生，如暈眩、嗜睡、姿勢性低血壓、心跳緩慢等，不建議老年人使用，如無法避免，請小心監測副作用發生。
4. 服藥後尿液曝露在空氣中可能會變黑，此為正常現象，本藥也可能罕見地造成舌頭變黑，停藥後即可恢復。
5. 若懷孕、計畫懷孕、哺乳、肝腎功能異常、有腦血管疾病、帕金森氏症者，請先告知醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/5/5 修訂】

BTC00EF32-02

Methyldopa 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Methyldopa	Methyldopa®	脈得保糖衣錠	250 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

症狀	處理方法
<ul style="list-style-type: none"> • 嚴重過敏 (癢或蕁麻疹、臉或手腫、嘴或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難) • 肝功能異常 (食慾降低、腸胃不適、茶色尿或大便顏色變淺、皮膚或眼睛變黃) • 不明原因的發燒 • 頭暈、暈厥或心律緩慢 • 胸痛 (可能與您的疾病有關，而與副作用無關) • 臉部、手臂或腿部不受控制的運動 • 異常出血、瘀傷或虛弱。 	請立即停藥就醫
乳房腫脹或壓痛 (無論男女)、肌肉或關節疼痛、噁心、嘔吐、腹瀉或便秘、快速增加體重、鼻塞或口乾。	症狀嚴重或持續時，請告知醫師
頭痛、鎮靜	在治療初期或劑量增加時比較容易發生，通常繼續服藥後會漸漸消失

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問
恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/5/5 修訂】

BTC00EF32-02