

Metoclopramide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Metoclopramide	Promeran®	胃明朗膜衣錠	3.84 毫克/錠

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 緩解噁心、嘔吐、胃灼熱、腹部疼痛、脹氣、食慾不振、餐後持續的腹脹感和上腸胃道蠕動不良等症狀。
2. 預防及治療逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。
2. 本藥請於飯前 30 分鐘服用，除非醫師特別指示。
3. 本藥不宜長期使用，連續使用不建議超過 12 週。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知對本藥或其任一成份有過敏的患者。
2. 疑似有嗜鉻細胞瘤患者(有引起血壓急劇上升之虞)。
3. 有消化道出血、穿孔或腸道阻塞的患者。
4. 癲癇病史者。
5. 遲發性運動障礙病史者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥應避免和酒精或鎮靜劑一起服用，可能會增加中樞抑制之副作用。
2. 服用本藥後可能會發生想睡、頭昏、暈眩。不要開車、操作機械或從事危險性高的動作，直到您習慣此藥對您的影響。
3. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳中的婦女、肝腎臟疾病病史、心臟病、帕金森氏病、憂鬱症、糖尿病、腸胃道出血、腸胃手術等病史，請告知您的醫師。
4. 若您正在服用思覺失調症藥物、憂鬱症藥物、強心劑、麻醉止痛藥等處方和非處方的用藥，請告知您的醫師。
5. 本藥可能會罕見地引起運動障礙：
 - 錐體外徑症狀，如頭、肩、頸等部位肌肉的痙攣、頭向後仰、舌外伸或捲曲、嘴巴歪斜、歪頭、眼球上吊、平衡或行走問題、小碎步、走路向前衝、肌肉僵硬、震顫、抽搐等。
 - 風險通常是隨治療時間和總累積劑量的增加而增加，應避免使用本藥超過 12 週。
 - 老年人與小兒較容易發生，尤其是脫水或發燒時，應避免使用，如必需使用，有上述運動障礙時，請立即停藥就醫。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/5/5 修訂】

BTC00EK13-02

Metoclopramide 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Metoclopramide	Promeran®	胃明朗膜衣錠	3.84 毫克/錠

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

症狀	處理方法
<ul style="list-style-type: none"> • 過敏反應：(瘙癢或蕁麻疹，臉或手腫脹，嘴或喉嚨腫脹或刺痛，胸悶，呼吸困難)。 • 無法控制的劇烈肌肉運動(通常在臉、頸、頭部、舌頭或下巴)、平衡或行走問題、小碎步、走路向前衝、嚴重的肌肉僵硬、震顫、抽搐。 • 乳房腫脹、乳房酸痛、乳頭溢液(男或女)。 • 異常的情緒或行為改變、傷害自己或他人的想法。 	請立即停藥就醫
頭痛、便秘、腹瀉、腹痛、胃痙攣、噁心、月經週期改變、心悸、心律不整、倦怠感。	症狀嚴重或持續時，請告知醫師

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/5/5 修訂】

BTC00EK13-02