

Metformin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Metformin	Uformin®	克糖錠	500 毫克/錠

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
治療第二型糖尿病。

- ◆ **用量與用法：**
 1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
 2. 服藥後若覺腸胃不適，可與食物併服用。

- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
 1. 對本藥或其賦形劑過敏者。
 2. 腎功能不全者。
 3. 曾有糖尿病酮酸中毒者。

- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

- ◆ **藥品儲存：**
 1. 儲存環境：室溫下(30°C)，避光、避濕及避熱。
 2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

- ◆ **注意事項：**
 1. 請隨身備有葡萄糖水或其他含糖的食物，預防低血糖。
 2. 本藥過量會導致一種罕見但嚴重的疾病，稱為乳酸性酸中毒。其發生通常伴有非特異性症狀，例如不適、肌痛、呼吸窘迫、嗜睡、腹痛，若有上述症狀請立即回診。
 3. 請告知醫師或牙醫正在使用本藥。在進行外科手術，X 射線，CT 掃描或其他醫學檢查之前，可能需要停止使用本藥。
 4. 本藥可能會使停經前婦女每月沒有固定的排卵期，導致無法預期的懷孕。
 5. 服用本藥前，若有下列事項請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、肝臟或腎臟疾病、心臟疾病或同時服用其他藥物。
 6. 部分中草藥或健康食品可能會影響血糖值，有需服用此類食品請先諮詢醫師或藥師。
 7. 除藥物治療外，應同時以飲食控制及適量運動來控制血糖。
 8. 服用本藥須定期至醫院就診及作例行性檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/5/5 修訂】

BTC00EM06-02

Metformin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Metformin	Uformin®	克糖錠	500 毫克/錠

◆ 可能引起的副作用和發生時的處理：

症狀	處理方法
嚴重低血糖昏迷	立即送急診
低血糖症狀 (虛弱、昏睡、昏亂、冒冷汗、顫抖、心悸、視力模糊、頭痛、飢餓)	立即吃含糖食物或飲料(糖果或果汁等)，若症狀未改善，則立即送急診
嚴重過敏 (搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或咽喉腫脹或刺痛、胸悶或呼吸困難) 乳酸中毒 (不適、肌肉痛、呼吸窘迫、異常虛弱、嗜睡、腹痛)	請停藥，並立即就醫
噁心嘔吐、無食慾、腹瀉、頭暈、口中有金屬味、胃腸不適、體重減輕	症狀嚴重或持續時，請告知醫師

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/5/5 修訂】

BTC00EM06-02