

Naltrexone 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Naltrexone HCl	Naltrexone [®]	鹽酸納曲酮膜衣錠	50mg/tab

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 用於有鴉片類藥物依賴和酒精依賴者進行戒癮的輔助治療。
2. 使用前應確認已停用鴉片類藥物一段時間後才可使用此藥品(海洛因約 5-7 天，美沙冬至少 10 天)。

◆ **用量與用法：**

1. 使用之劑量因病及因人而異，請遵循醫師指示服用，勿自行增減或突然停藥。
2. 鴉片依賴患者，初始劑量為每日 25 毫克(半錠)，之後每日服用 1 錠。
3. 酒精依賴患者維持戒酒，建議劑量為每日 50 毫克(1 錠)。單日劑量不要超過 150 毫克(3 錠)

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品或其賦形劑過敏者。
2. 目前濫用鴉片類藥物成癮者
3. 同時使用含有鴉片類成分的藥物(如含有鴉片類藥物的咳嗽藥、感冒藥或止瀉劑、毒品等)。
4. 急性肝炎者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 每日服藥者：想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，不可服用兩倍劑量。
2. 每 2-3 天服藥一次者：可透過每日服用 1 錠以彌補劑量，直至下一次定期給藥。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 30℃ 以下儲存，避光、避濕及避熱。

◆ **注意事項：**

1. 攝取高劑量鴉片類藥物同時服用本藥治療，可能會造成呼吸及循環障礙，進而導致致命性的鴉片類中毒。
2. 不可在服用本藥期間併用鴉片類藥物，包括含有鴉片類藥物的咳嗽藥、感冒藥或止瀉劑、毒品等。服藥期間若需使用上述藥品，請先諮詢您的醫師或藥師。
3. 本藥可能會影響精神狀態及操作機械能力，服藥後請避免開車或操作危險性機械。
4. 鴉片依賴患者使用本藥，可能會在短時間(5 分鐘~48 小時)內發生戒斷症候群。戒斷症狀出現時應就醫接受症狀治療。
5. 酒精濫用患者在治療前與治療期間應定期回診監測肝功能，以避免肝功能嚴重損傷發生。若發生食慾降低、噁心、腹脹、腹痛、眼睛或皮膚變黃，請立即就醫。
6. 服藥期間若發生疼痛的情況，只能使用非鴉片類的止痛藥，止痛藥的選擇請諮詢您的醫師或藥師。
7. 本藥可能會增加自殺的念頭。如果您開始感到沮喪或有傷害自己的想法，請告知醫師。
8. 患有半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酵素缺乏症或葡萄糖-半乳糖吸收不良等罕見遺傳問題的患者，不應服用此藥物。

Naltrexone 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Naltrexone HCl	Naltrexone [®]	鹽酸納曲酮膜衣錠	50mg/tab

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 嚴重過敏：癢或蕁麻疹、臉或手腫脹、嘴或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
- 服藥期間若發生鴉片類中毒或嚴重戒斷症狀(如呼吸及循環障礙)。
- 沮喪或不正常的思想和行為、自殺傾向。
- 肝功能異常：食慾降低、噁心、腹脹、腹痛、眼睛或皮膚變黃。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

精神混亂、憂鬱、神經質、焦慮、失眠、頭暈或嗜睡、頭痛、腹痛、噁心嘔吐、肌關節痛。