

## Oseltamivir 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oseltamivir phosphate	Tamiflu®	克流感膠囊	75 毫克/膠囊
	Eraflu	易剋冒膠囊	

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 成人和兒童(包含足月新生兒)的流行性感冒之預防及治療。

◆ **用量與用法：**

1. 成人及 13 歲以上青少年建議劑量：每天 2 次，每次一顆，服用 5 天。

2. 1 歲或以上兒童用藥須依體重調整劑量，如下：

體重	建議劑量，為期 5 天	體重	建議劑量，為期 5 天
≤ 15 公斤	30 毫克(0.4 顆)，每天 2 次	> 23-40 公斤	60 毫克(0.8 顆)，每天 2 次
> 15-23 公斤	45 毫克(0.6 顆)，每天 2 次	> 40 公斤	75 毫克(1 顆)，每天 2 次

3. 膠囊若不是整顆吞服，為使服用劑量精確，請依下述方法加冷開水配製成口服懸浮液。

### 口服懸浮液泡製方法：

↓ 將本次領到的所有膠囊剝開，藥粉倒出放入瓶中。

↓ 加入 50 毫升的冷開水，蓋上瓶蓋，振搖均勻。

↓ 每次服用前請先充分搖勻，以量杯量取 5 毫升服用，每天服用 2 次，連續服用 5 天。

↓ 如需要可在量取好的 5 毫升藥液中加入糖粉調味。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。

2. 泡製成懸浮液後，25°C 以下可儲存 5 天，請按時服用完畢。

3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對 oseltamivir phosphate 或其任何成份會產生過敏。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **注意事項：**

1. 服藥後即使症狀消失，仍須繼續使用到療程結束，請勿自行停藥。

2. 服藥後如果症狀沒有改善，甚至惡化，請回診就醫。

3. 本藥不能替代每年的流感疫苗，也不會預防細菌感染。流感的高風險人員應每年接種流感疫苗。

4. 服用本藥可能罕見地發生癲癇、精神錯亂、自殘、妄想行為、感覺異常、幻想、嗜睡或意識障礙的神經精神事件，極少數會導致意外傷害，甚至墜樓，應小心預防。家屬及家長應特別監測流感病患(特別是小孩及青少年)不尋常行為的徵兆。

5. 有使用任何藥物(包括處方藥、非處方藥、維他命、中草藥)，尤其是免疫抑制劑或是類固醇，請先告知醫師。

6. 懷孕或準備懷孕、哺乳婦女、有免疫系統疾病、腎臟、肝臟、心臟或肺臟疾病，或是曾對任何藥品有過敏史，請先告知醫師。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/7/14 修訂】

### Oseltamivir 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Oseltamivir phosphate	Tamiflu®	克流感膠囊	75 毫克/膠囊
	Eraflu	易剋冒膠囊	

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

症狀	處理方法
-過敏反應：皮膚起水泡、脫皮、紅疹、蕁麻疹、臉或手部腫脹、嘴或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難 -精神混亂、激動、幻聽或幻覺、自殘、妄想行為、情緒或行為改變 -癲癇發作 -肝功能異常：食慾降低、噁心、腹脹、腹痛、皮膚或眼睛變黃	請立即停藥就醫
頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、胃痛或胃部不適	症狀嚴重或持續時，請告知醫師

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/7/14 修訂】

BTC00EB02-02