

## Rivastigmine 外用貼片衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Rivastigmine	Exelon® Patch 5	憶思能穿皮貼片 5	4.6 毫克/24 小時
	Exelon® Patch 10	憶思能穿皮貼片 10	9.5 毫克/24 小時

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
輕度至中度阿滋海默氏病之癡呆(失智)症。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 已知對 rivastigmine、其他 carbamate 衍生物或配方中的賦形劑過敏者。
2. 使用穿皮貼片有接觸性皮炎過敏史。

◆ **用量與用法：**

每 24 小時應更換新的貼片，在貼新的貼片前，應先將前一天的貼片撕下來，每一次只能貼一片貼片。貼片不可剪裁。

**黏貼部位：**

- ✓ 清潔、乾燥、無毛髮、完整健康的皮膚上。
- ✓ 優先貼於上背或下背部(病人較不易自行移除)，其次為上手臂或胸部。
- ✓ 每日輪流貼於不同部位，相同部位於 14 天內不可再貼新貼片，以避免刺激皮膚。
- ✗ 不可貼於發紅、受刺激、割傷的皮膚。
- ✗ 不可貼於剛擦乳霜、乳液、或粉末的皮膚。
- ✗ 不可貼於會因穿著而磨擦掉貼片部位或皮膚皺摺處。

**使用步驟：**

- ↓ 先撕下前一天貼的貼片，將黏性面朝內對折並壓緊放置一旁。(第一次使用請略過此步驟)
- ↓ 延虛線剪開封袋(勿剪到貼片)，取出貼片，保留封袋稍後使用。
- ↓ 黏性面(覆蓋有保護襯片)朝上，撕開一邊的保護襯片，手勿碰觸到黏性面。
- ↓ 已撕開襯片的黏性面貼至皮膚上，再將另一邊的保護襯片撕開。
- ↓ 用手掌按緊貼片至少 30 秒，確保各邊緊密黏附。
- ↓ 用過對折的貼片放進先前保留的封袋，並安全的丟棄到小孩拿不到地方。
- ↓ 用肥皂及清水將手洗淨。

◆ **貼片掉落或忘記更換貼片時該如何處理？**

1. 應立即貼上新的貼片，到了下次的給藥時間，再換貼另一片貼片，不可同時貼二片來補償忘記貼的劑量。
2. 若漏貼憶思能穿皮貼片已超過 3 天，在貼上新貼片之前請聯絡您的醫師。您可能需要以較低劑量的 rivastigmine 重新開始治療，以避免發生嚴重的噁心嘔吐。

◆ **注意事項：**

1. 貼片的袋子封口若被破壞，或貼片被裁剪、破損、有任何改變時，不可使用。
2. 同一時間只能貼一片，貼二片以上可能會導致住院，或罕見情況下可能導致死亡。在貼新片前先撕下舊片是很重要的。

### Rivastigmine 外用貼片衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Rivastigmine	Exelon® Patch 5	憶思能穿皮貼片 5	4.6 毫克/24 小時
	Exelon® Patch 10	憶思能穿皮貼片 10	9.5 毫克/24 小時

3. 貼上貼片和撕除貼片後，請用肥皂及清水將手洗淨。若不慎觸及眼睛，眼睛變紅，請立刻以大量清水沖洗，若症狀未解除應尋求醫療協助。
4. 洗澡、游泳或淋浴不會影響貼片，避免將貼片長時間曝露在外部的熱源(過度日曬、三溫暖、日光浴、長時間接觸電熱毯)。
5. 本藥品可能會造成困倦、眩暈、虛弱或昏暈，請勿駕車、操作危險性機械或從事危險性活動，除非您已習慣本藥對您的影響。
6. 治療期間可能會發生腸胃道不良反應，如噁心嘔吐、腹瀉、食慾不振、體重減輕等，尤其在開始使用時或劑量增加時，若持續且嚴重請告知醫師。
7. 若您體重偏輕(小於 50 公斤)或肝功能異常，應注意是否有發生較嚴重的副作用(如嚴重噁心嘔吐等)。
8. 少數人使用後曾發生嚴重的過敏性接觸性皮膚炎(皮膚紅腫熱、起水泡、脫皮、滲出液體或結痂)，若皮膚反應擴散超出貼片範圍、或症狀加劇、或撕下貼片後 48 小時內症狀未改善，請立即停藥就醫。
9. 請告知醫師所有您正在服用的藥物，包括處方藥、非處方藥、維生素及中草藥，尤其是非固醇類發炎止痛藥、其他治療失智症或帕金森氏症藥物、抗膽鹼藥物(如過敏藥、感冒藥、暈車藥、治療膀胱過動或腸道痙攣藥物)、metoclopramide。
10. 懷孕或準備懷孕、哺乳、肝功能異常、胃潰瘍、預定進行手術、心臟疾病、排尿困難、癲癇病史、震顫、氣喘或其他呼吸道疾病、食慾低落或體重持續減輕，請先告知醫師。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
- 皮膚嚴重紅腫熱、起水泡、脫皮、滲出液體或結痂 - 胃痛、胃灼熱、咖啡色嘔吐物、黑便 - 呼吸急促、呼吸困難 - 癲癇	請撕下貼片，並立即就醫
- 皮膚輕微紅腫痛、敏感 - 噁心、嘔吐、腹瀉、食慾不振、體重減輕 - 心跳過慢、排尿困難 - 頭暈、頭痛、眩暈、困倦、睡眠障礙、憂鬱、焦慮、顫抖	症狀嚴重或持續時，請告知醫師

◆ **藥品儲存：**

1. 將憶思能穿皮貼片存放在 30°C 以下。
2. 使用憶思能穿皮貼片之前，一律將貼片存放於密封的封袋內。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/7/15 修訂】

BTC00EG01-02