

Ketorolac 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ketorolac	Keto [®]	克多炎腸溶微粒膠囊	10 毫克/膠囊

◆ **用途：**（一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡）

1. 疼痛之短期療法。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥品或其賦形劑、其他非類固醇止痛消炎藥或 Bokey[®] 伯基腸溶微粒膠囊過敏者。
2. 急性胃潰瘍、出血、穿孔患者或曾有過胃潰瘍、出血、穿孔病史者。
3. 懷疑或已證實腦血管出血、有出血傾向體質、止血不全、具出血之高危險群病人。
4. 懷孕婦女(懷孕 > 28 週)、臨盆、授乳婦。
5. 進行冠狀動脈繞道手術前疼痛的緩解。
6. 曾因服用非類固醇止痛消炎藥或 Bokey[®] 伯基腸溶微粒膠囊而發生氣喘者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 服用本藥避免和含有酒精成分的飲料併服，否則會增加藥品腸胃道方面的副作用。
2. 服用本藥應盡量避免攝取當歸、大蒜、薑、人蔘、甘草、綠茶等會影響凝血功能的藥物或食物。如無法避免，應注意有無不正常出血的情形。
3. 本藥僅限於疼痛的短期治療，因長期服用可能會增加副作用之發生，故不建議慢性疼痛之患者使用。一般治療以手術後止痛不超過 5 天，其他急性、中至重度疼痛之止痛不超過 7 天為原則。
4. 若已懷孕、計畫懷孕、哺乳中的婦女、有心血管疾病、肝、腎疾病、血液功能問題、氣喘、眼睛曾有過病毒感染或現正感染和配戴軟式隱形眼鏡的患者等，請告知您的醫師。
5. 請告知您的醫師和您現在服用的所有藥品，包含處方或非處方的用藥。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即至急診就醫(過敏反應)
嚴重暈眩、呼吸急促或不規則、心跳變快或不規律、臉部或腳部因蕁麻疹腫脹。
2. 如發生以下症狀時，請立即就醫(過量或嚴重副作用)
腹部或胃灼熱或絞痛、黑便、胸痛、癲癇、不尋常出血。
3. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
頭痛、眼睛或皮膚變黃、浮腫、體重增加、呼吸困難、眼睛對光敏感。
胃腸不適：於飯後服用可減少此副作用。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/7/20 修訂】

BTC00EH11-02