

Lidocaine 外用貼片衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Lidocaine	Lidopat® Patch	遠疼貼貼片	700 毫克/貼片

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
緩解皰疹後神經痛。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次。
2. 24 小時貼一次，每次最多貼 3 片，一次使用不可超過 12 小時。

黏貼部位：疼痛部位之完整未受損皮膚。

使用步驟：

- ↓ 貼片自密封的封袋取出。(未用之貼片請存放於密封的封袋內)
- ↓ 貼片可以用剪刀剪成適當大小。
- ↓ 撕除透明保護膜並貼於疼痛部位之皮膚上，以手掌按壓數秒使貼片緊貼於皮膚上。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對醯胺類化合物型態(Amide-type)的局部麻醉劑過敏或本品其他組成過敏者。
2. 第二及第三級房室阻斷(未使用心臟節律器者)、嚴重性竇房結阻斷(未使用心臟節律器者)、目前正使用 Class I 抗心律不整藥物、曾使用 amiodarone，因心律不整引起之低血壓、心律過緩、心室性心律不整。

◆ **注意事項：**

1. 身體貼有貼片的部位，應避免長時間接觸熱源，如接觸電毯、熱敷、泡溫泉。
2. 如有刺痛或灼熱感，請移除貼片，直至刺痛感消失。
3. 用過的貼片仍含有大量的 Lidocaine (約 95% 殘留)，如有兒童或寵物不慎咀嚼或攝取，皆可能造成嚴重的不良反應。使用過的貼片應該立即對折丟棄，以預防小孩或寵物有接觸機會。
4. 如果發生黏貼部位反應(發紅、發炎、水泡、疼痛、腫脹)，一般來說是溫和且暫時的，會在數分鐘到數小時內消失。
5. 如有心悸、頭暈、短暫性視覺昏暗或其他心律不整的症狀，請撕下貼片並就醫。
6. 使用藥品前，若有下列事項請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、肝臟疾病或心臟疾病。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
過敏反應(搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或咽喉腫脹或刺痛、胸悶或呼吸困難)、心悸、頭暈、短暫性視覺昏暗、心律不整症狀	請立即撕下，並立即就醫
黏貼部位反應(發紅、發炎、水泡、疼痛、腫脹)	症狀嚴重或持續時，請告知醫師

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫 25°C 以下陰涼處，避免陽光直射。
2. 存放於孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7150。【2021/5/10 修訂】

BTC00EH17-02