

Flurbiprofen 外用貼片衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Flurbiprofen	Flur Di Fen patch	富帝芬貼片	40 毫克/貼片

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
變形性關節症、扁關節周圍炎、肌腱韌鞘炎、腱周圍炎、上腕骨上髁炎、筋肉痛、外傷之腫脹疼痛等上述疾患及症狀之鎮痛消炎。

◆ **用量與用法：**

請遵循醫師指示使用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

黏貼部位：疼痛部位之完整未受損皮膚。

使用步驟：

↓ 先將患處清洗並拭乾以增強黏著性及藥效。

↓ 貼片可依患部切割成適當大小。

↓ 撕除透明保護膜並貼於疼痛部位之清潔、乾燥的皮膚上，確實向下壓平粘牢。
(於關節等易脫落之部位，可用膠帶或伸縮繃帶固定)

↓ 以肥皂及清水將手洗淨

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

已知對 Flurbiprofen 或配方中的賦形劑過敏者。

◆ **忘記用藥時該如何處理？**

應立即貼上新的貼片，但若接近下次的給藥時間，則略過一次劑量，於下次正常給藥時間使用，不可使用雙倍劑量來補償忘記使用的劑量。

◆ **注意事項：**

1. 勿使用於下列部位：眼睛四周、黏膜處、溼疹、癢疹、傷口等部位。
2. 懷孕或準備懷孕、哺乳，請先告知醫師。
3. 兒童需在保護者指導監督下才可使用，2 歲以下兒童之使用需詢問醫師或藥師。

◆ **可能引起的副作用和發生時的處理方法：**

用藥後副作用不常發生，但偶爾有

症狀	處理方法
嚴重過敏(搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或咽喉腫脹或刺痛、胸悶或呼吸困難)	請撕下貼片，並立即就醫
黏貼部位反應(發紅、發炎、水泡、疼痛、腫脹)	症狀嚴重或持續時，請告知醫師

◆ **藥品儲存：**

1. 將富帝芬貼片存放在 30°C 以下乾燥陰涼處，避免陽光直射。
2. 準備使用富帝芬貼片之前，一律將貼片存放於密封的封袋內。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/4/14 修訂】

BTC00EH18-02