

Calcium polystyrene sulfonate 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Calcium polystyrene sulfonate	Kalimate®	加利美粉	5 克/包

◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 治療急性或慢性腎功能不全伴隨之高血鉀症。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數。

2. 請將本藥品粉末加 30-50 mL 的水混合均勻後再服用。

3. 若從直腸給藥，藥粉加約 100 mL 的水混合均勻後，從肛門注入直腸，並將藥液停留於直腸 30 分鐘到 1 小時後再排掉。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥和其所含賦形劑過敏者。

2. 低血鉀之病患。

3. 因手術或藥物引起之腸胃道蠕動降低的新生兒。

4. 腸閉塞之患者。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存環境：室溫下，避光、避濕及避熱。

2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。

◆ **注意事項：**

1. 本藥若蓄積在腸道可能會造成腸道的不良影響，因此服用本藥應注意是否有便秘情形，若有腹痛、腹部膨脹感、嘔吐等症狀，應回診就醫。

2. 若已懷孕、計畫懷孕、要哺乳的婦女、容易引起便秘之患者、腸管狹窄、消化性潰瘍、副甲狀腺亢進、多發性骨髓腫、或其他病史等，請告知您的醫師。

3. 若您有服用強心劑，如 Digoxin®(有可能增加 digoxin 的中毒作用)、含有鎂、鋁、鈣之制酸劑，如 MgO®氧化鎂錠、Peichia®培佳治錠(有可能減弱本藥品之效果)等其他處方或非處方的用藥，請告知您的醫師。

4. 沒有醫師指示，不可自行停藥或調整劑量。

5. 請定期至醫院就診及檢查，作為醫師調整藥物的依據，並維持體內電解質的平衡，以確保藥物療效及用藥安全。

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

嚴重便秘、持續腹痛、嘔吐、低血鉀症狀(精神混亂、無法正常思考、肌肉無力麻痺)、過敏症狀(皮膚紅疹、臉部手部浮腫、胸悶、呼吸困難)

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

噁心、嘔吐、食慾不振、厭食、胃部不適、便秘(高劑量使用時)。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/7/27 修訂】

BTC00EI07-02