

Rivaroxaban 口服製劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|-------------|------------------------------|--------|---------|
| Rivaroxaban | Xarelto® film-coated tablets | 拜瑞妥膜衣錠 | 10 毫克/錠 |
| | | | 15 毫克/錠 |
| | | | 20 毫克/錠 |

◆ **用途：**(一種藥可能有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)

1. 用於非瓣膜性心房顫動(non-valvular atrial fibrillation)且有下列至少一項危險因子的成人，預防中風及全身性栓塞(systemic embolism)。危險因子例如：心衰竭、高血壓、年齡大於等於 75 歲、糖尿病、曾發生腦中風或短暫性腦缺血(transient ischemic attack)。
2. 用於靜脈血栓高危險群(曾發生有症狀之靜脈血栓症)病人，以預防其於接受下肢重大骨科手術後之靜脈血栓栓塞症(VTE)。
3. 治療深部靜脈血栓與肺栓塞及預防再發性深部靜脈血栓與肺栓塞。

◆ **用量與用法：**

1. 請遵循醫師指示使用，切勿自行更改廠牌、藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
2. Xarelto 15 毫克、20 毫克應隨餐服用；Xarelto 10 毫克可餐前或餐後服用。
3. 吞嚥困難的病人，本藥可以磨粉或剝半後與水或流質食物混合後立即服用。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

1. 對本藥任一成分過敏者。
2. 正在嚴重出血的病人。
3. 凝血功能異常和會導致出血風險的肝病患者。
4. 孕婦或授乳婦。
5. 嚴重腎功能受損(肌酸酐廓清率小於 15 毫升/分鐘)。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 不同的適應症有不同的處理方式 請諮詢醫師或藥師。
2. 每天一次：如果您錯過劑量或忘記使用藥物，同一天內想起請盡快使用。隔日想起請按時服用當日劑量即可，勿加倍劑量。
3. 每天兩次：如果您錯過劑量或忘記使用藥物，同一天內想起請盡快使用，您可以同時服用 2 劑以確保每日服用足夠劑量。若隔日想起請按時服用當日劑量即可，勿加倍劑量。

◆ **藥品儲存：**

1. 儲存在 30°C 以下，避光、避濕及避熱。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將藥送予他人使用。

◆ **注意事項：**

1. 進行包括神經軸麻醉或脊椎穿刺在內的背部醫療程序，本藥可能會增加血腫風險而導致神經損傷，請主動告知醫生正在服用本藥。若術後出現任何神經疾患的跡象，如背痛、麻木或刺痛感、肌肉虛弱無力、麻痺、大小便失禁，請立即停藥就醫。
2. 在進行手術、拔牙或侵入性檢查前，請主動告知醫師或牙醫正在服用本藥，通常手術前需停藥至少 24 小時。
3. 服用本藥後較容易出血，宜避免從事易引起受傷之運動或活動；建議使用軟毛牙刷及電動刮鬍刀，避免用力挖鼻孔或擤鼻涕。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

思主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150【2020/6/16 修訂】

BTC00EL08-02

Rivaroxaban 口服製劑衛教單張

| 學名 | 商品名 | 中文名 | 含量/劑型 |
|-------------|------------------------------|--------|---------|
| Rivaroxaban | Xarelto® film-coated tablets | 拜瑞妥膜衣錠 | 10 毫克/錠 |
| | | | 15 毫克/錠 |
| | | | 20 毫克/錠 |

- 拜瑞妥含有乳糖，患有半乳糖不耐症、Lapp 乳糖酶缺乏症或葡萄糖半乳糖吸收不良者，不應服用本藥。
- 使用本藥前，若有下列事項請先告知醫師：懷孕或準備懷孕、哺乳、肝、腎臟疾病、出血問題、癌症、肺部疾病、有人工心臟瓣膜或抗磷脂症候群等。
- 併有其他出血危險因子的病患，如先天性或後天性出血疾病、不受控制的嚴重動脈高血壓、活性期潰瘍性胃腸道疾病、新近的胃腸道潰瘍、視網膜血管病變、新近的顱內或腦內出血、脊椎或顱內血管異常、在大腦、脊椎或眼科手術後不久、支氣管擴張或肺出血等疾病，請小心使用。
- 有使用任何藥物，包括處方藥、非處方藥，維生素和中草藥，尤其是抗生素、抗黴菌藥、非類固醇消炎止痛藥、精神科藥物(SSRI、SNRI)，請先告知醫師。
- 長期服用本藥須定期至醫院就診及作例行性檢查，以作為醫師調整藥物的依據，並且可確保藥物療效及用藥安全。
- 請勿在沒有詢問醫生的情況下突然停藥。

◆ 可能引起的副作用和發生時的處理方法：

服用藥後副作用不常發生，但偶爾有

| 症狀 | 處理方法 |
|---|----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - 過敏反應：搔癢、蕁麻疹、面部或手部腫脹、口腔或咽喉腫脹或刺痛、胸悶或呼吸困難。 - 出血現象：經血過多、血尿、血便或黑便、流鼻血、牙齦出血、瘀傷、嘔血。 - 背痛、麻木或刺痛感、肌肉虛弱無力、麻痺、大小便失禁。 | 請停藥，並立即就醫 |
| 噁心、嘔吐、腹痛、腹瀉、便秘、頭暈、頭痛、發燒、虛弱、四肢疼痛、肝指數上升。 | 症狀嚴重或持續時，請告知醫師 |