

Ciclesonide 吸入製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ciclesonide	Alvesco [®]	保衛康治喘樂吸入劑	160 微克/噴；60 噴/瓶

◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)
為吸入性類固醇製劑，用於氣喘的預防性治療，減少急性氣喘發作。

◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**

對於 Alvesco 所含任一成分過敏的病患。

◆ **吸入器使用步驟：**

如果使用新的吸入劑或超過 7 天以上未使用時，須先對空氣噴 3 次後才可開始使用

1. 移去吸入器的紅色蓋子，不需搖晃瓶子。
2. 慢慢地儘可能的呼氣，將肺部空氣盡量呼出。(勿直接對吸入器呼氣)
3. 將吸入劑噴嘴放入口中輕輕含住。
4. 緩慢且深深地吸氣，吸氣同時用手按下吸入劑頂端，使藥物噴出。
5. 緩慢吸氣直到飽滿為止。
6. 將吸入器移開後閉氣至少 10 秒鐘。
7. 慢慢地呼氣並恢復正常呼吸。
8. 若醫師指示需吸一次以上，則間隔 30 秒鐘後重覆上述步驟 2~7。
9. 結束所有劑量後，以水漱口，漱口水勿吞下。

吸入器清潔：

1. 每週請用衛生紙或乾布擦拭噴嘴一次。
2. 勿用水清洗或放於水中。

◆ **藥品儲存：**

1. 容器內含增壓液體，請室溫下儲存，防止藥物受熱或明火，並請勿放入水中。
2. 容器內容物看似已空，仍請將其刺穿或燃燒。
3. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人使用。

◆ **忘記服藥時該如何處理？**

1. 如果忘記吸藥的話，在記起來的時候，立即使用。但如果距離下次用藥的時間太近的話，就應該跳過此次的藥量，等到下次正常用藥的時間，千萬不可一次使用雙倍的劑量。

◆ **注意事項：**

1. 使用前，請先諮詢並學習噴霧劑正確操作方法。
2. 當藥品為一天使用一次時，比較建議在晚上使用。
3. 每次用藥後都要漱口，避免口腔及喉部念珠菌感染(鵝口瘡)發生。若口腔或喉嚨發紅或有白苔，請立即就醫。
4. 若您的呼吸問題惡化、急救吸藥器沒有發揮作用或需要使用急救吸藥器的頻率提高，請立即聯絡您的醫師。
5. 可能需要使用數週後，才能充分顯現療效。請依醫師指示使用，切勿自行停藥。
6. 您有較高的機率會受到感染。經常洗手，遠離受感染、感冒或流行性感冒的人，避免靠近罹患水痘和麻疹的任何人。

Ciclesonide 吸入製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Ciclesonide	Alvesco®	保衛康治喘樂吸入劑	160 微克/噴；60 噴/瓶

◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫

- 皮膚紅疹等過敏反應。
- 感染徵象：發燒、發冷、重度喉嚨痛、耳朵或鼻竇疼痛、咳嗽、多痰或痰液有顏色變化、排尿疼痛、口瘡或傷口不癒合。
- 口腔或喉嚨發紅或有白苔(口腔及喉部念珠菌感染)
- 支氣管痙攣、氣喘症狀惡化。

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師

頭痛、背痛、四肢疼痛、關節痛、口腔或喉嚨乾燥、聲音沙啞。