

## Empagliflozin + Linagliptin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Empagliflozin / Linagliptin	Glyxambi®	糖順平膜衣錠	E 25/ L 5 毫克/錠劑

- ◆ **用途：**(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡)  
治療第二型糖尿病。
- ◆ **用量與用法：**
  1. 請遵循醫師指示服用，切勿自行更改藥量、頻次、使用天數或突然停藥。
  2. 可與食物一起服用，亦可空腹服用。
- ◆ **不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：**
  1. 患有重度腎功能不全、末期腎病或正接受透析的病人。
  2. 曾對本藥任一有效成分或賦型劑出現嚴重過敏反應，例如急性過敏、血管性水腫、鱗片狀脫皮、蕁麻疹、支氣管過敏。
- ◆ **忘記服藥時該如何處理？**
  1. 想起時儘快服用；若接近下次服藥時間，按時服用下次劑量即可，千萬不可服用兩倍劑量。
- ◆ **藥品儲存：**
  1. 儲存環境：請儲存於 30°C 以下。
  2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，同時勿將此藥送予他人服用。
- ◆ **注意事項：**
  1. 開始使用本藥可能會發生症狀性低血壓，請定期量測血壓並注意頭暈等低血壓症狀。同時應攝取充足的水分，避免因脫水而提升低血壓的發生風險。
  2. 服用本藥可能會增加尿路感染或生殖器真菌感染的風險，如有頻尿、排尿困難、發燒、生殖器感染的症狀，請回診就醫。
  3. 使用本藥會增加體內水分的排除，可能會造成脫水的情況，所以需要適時補充水分。
  4. 併用胰島素與胰島素促泌劑時的低血糖症狀發生率高，若有併用應特別注意低血糖症狀。若出現低血糖症狀(例如:虛弱、嗜睡、飢餓、冒冷汗、心跳加速)，請立即服用果汁或糖果，同時請勿開車或操作危險機械。若症狀仍無改善，請立即就醫。
  5. 由於是複方藥品請告知您的醫師您正在服用的處方藥品，以減少重複用藥的發生。
  6. 懷孕、計畫懷孕、哺乳或計畫哺乳的婦女，請先告知醫師。
  7. 除按時服藥外，應配合飲食及規律運動，並定期監測血糖值，以達良好血糖控制。
- ◆ **本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？**
  1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
    - 嚴重過敏反應、呼吸急促或困難。
    - 泌尿道或生殖器感染：血尿、排尿有燒灼感或疼痛、頻尿、發燒；(女)白帶或黃帶、陰道癢癢或有異味；(男)陰莖發紅、發癢、疼痛或腫脹。
    - 急性胰臟炎：嚴重胃痛、嚴重背痛或嚴重胃部不適或嘔吐。
    - 酮酸中毒：噁心、嘔吐、腹痛、身體不適、呼吸急促。
    - 無法排尿、排尿量改變、血尿或體重大幅增加。

該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/12/1 修訂】

BTC00EM26-02

### Empagliflozin + Linagliptin 口服製劑衛教單張

學名	商品名	中文名	含量/劑型
Empagliflozin / Linagliptin	Glyxambi®	糖順平膜衣錠	E 25/ L 5 毫克/錠劑

2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師  
鼻咽炎、上呼吸道感染、關節疼痛。
3. 請注意低血糖現象：  
症狀：虛弱、昏睡、昏亂、冒冷汗、顫抖、心悸、視力模糊、頭痛、飢餓等。  
處理方法：立即吃含糖食物或飲料(糖果或果汁等)，若症狀未改善，則立即送急診。



該藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物使用的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2020/12/1 修訂】

BTC00EM26-02