

Polymyxin B + Neomycin + Lidocaine 耳用製劑衛教單張

商品名	中文名
Otozambon®	耳多贊邦點耳液

◆ 組成：

每瓶含 8 毫升，每毫升含：抗生素 Polymyxin B sulphate 10000 IU、抗生素 Neomycin sulphate 5 毫克、局部麻醉劑 Lidocaine HCl 40 毫克

◆ 用途：(一種藥可能會有許多療效，下述僅為此藥常用用途，若您的病情與下述不同，請與我們聯絡細菌性引起之耳部感染及耳部外聽道發炎。

◆ 用量與用法：

抗生素請遵循醫師指示使用，即使病情好轉，仍應完成整個療程，勿自行停藥。

◆ 使用方式：

1. 使用潤濕的紙巾將耳朵清潔乾淨和擦乾，用肥皂及清水將雙手洗淨。
2. 用手握住耳用滴瓶數分鐘，使溫度接近體溫。
3. 將耳滴劑振搖均勻，打開瓶蓋，使滴管頭朝下。
4. 側躺或傾斜或趴在桌上，將用藥的耳朵朝上，成人耳朵往後上方拉，小孩耳朵往後下方拉，有助於藥液流入耳朵內，依醫師指示用量，滴入耳朵，並避免瓶口碰觸到皮膚。
6. 保持原側躺姿勢 10 分鐘，使藥液停留在耳朵內。
7. 若另一側耳朵也需用藥，重複上述步驟 1-6。
8. 用畢，將瓶蓋關緊，雙手洗淨。

◆ 不宜使用此藥的情形(使用禁忌)：

1. 對本藥或其賦形劑成分過敏者。
2. 鼓膜有穿孔。

◆ 忘記服藥時該如何處理？

想起時儘快使用；若接近下次用藥時間，按時使用下次劑量即可，不可使用兩倍劑量。

◆ 藥品儲存：

1. 請儲存於室溫 25°C 以下，避光、避熱、避濕。
2. 將藥品放在孩童拿不到的地方，勿將此藥送予他人服用。

◆ 注意事項

1. 如果藥水溫度過低，滴入時可能會發生暈眩的現象，可以用手握住耳用滴瓶數分鐘，使藥水溫度接近體溫。
2. 點耳時，應注意避免瓶口接觸耳朵而造成藥水汙染
3. 除非醫師指示，請勿連續使用超過 10 天。

◆ 本藥可能引起哪些副作用？當發生時該如何處理？

1. 如發生以下症狀時，請立即就醫
過敏反應
2. 如以下症狀嚴重且持續時，請告知醫師
耳痛、耳朵癢、不明分泌物、頭痛、暈眩。

藥品的資訊無法全部列出，若您有任何藥物相關的問題，請向您的醫師或藥師詢問

恩主公醫院藥物諮詢專線：26723456 轉 7034、7150。【2021/7/23 修訂】